

# بارازول

بودرة

طاراد الديدان ذو الفعالية الواسعة

التركيب: كل غم يحتوي على:

120 ملغم

فلوبندازول

## الخواص:

- مأمون وسهل الاستعمال.
- ليس له أي تأثير سلبي على معدلات انتاج البيض وخصوبته وفسسه وعلى استهلاك العلف ، بل على العكس فهو يؤدي الى زيادة تلك المعدلات بعد استعماله.
- فعال جداً ضد أنواع الديدان المختلفة (الاسكارس، والشعرية، والمزدوجة، والشريطية) والتي تصيب الدواجن والطيور البرية (الحجل والقران)، ودجاج الحبش (الرومي)، والطيور المائية (البط والاوز)، وكذلك ضد الديدان السوطية في الاغنام.

## الإستطبابات:

- معالجة و مكافحة اصابات الديدان المعوية المختلفة: الديدان الاسطوانية الكبيرة (اسكارديا)، والديدان الاسطوانية الصغيرة (ديدان الاعورين / هيتراكيس)، والديدان الشعرية (ديدان الحوصلة / كابيلاريا)، وديدان القصبه الهوائية او المزدوجة (سينجامس)، والديدان الشريطية (رايلاتينا، دافانيا) وديدان تريكوسترونجايلس، وديدان اميدوستومم.
- ينصح باستعماله لمعالجة الديدان السوطية (تريكيبوريس) في الاغنام.

## الجرعات: (المعالجة لمدة 7 أيام متتالية).

- للحصول على افضل النتائج، ينصح باتباع البرنامج التالي:
  - الدواجن: 250 غم لكل طن علف.
  - قطعان البياض (تربية ارضي) وقطعان الامات:
    - تبدأ المعالجة على عمر 10 اسابيع، وتكرر على عمر 20 اسبوعا، ثم كل ثلاثة اشهر.
    - قطعان البياض (تربية اقفاص): تبدأ المعالجة فور وصول القطيع الى الاقفاص.
  - دجاج الحبش (الرومي): 165 غم لكل طن علف، وتبدأ المعالجة عند الاسبوع الرابع من العمر، وتكرر بعد ثلاثة اسابيع ثم كل شهرين.
  - البط والاوز: 250 غم لكل طن علف.
  - الطيور البرية: 500 غم لكل طن علف.
  - في حالة الاصابة بالديدان الشريطية تضاعف الجرعة ولمدة نفسها.
  - الاغنام: يعطى مع العلف بمعدل 0.08 غم لكل كغم وزن جسم ولمدة اسبوع.
  - (10 ملغم مادة فعالة / كغم وزن جسم).

## فترة الامان:

- لاستهلاك اللحوم: 15 يوم.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 م°.

العبوات: (250، 500، 1000) غم.