

# بوفيدون أيودين

محلول

مطهر و معقم

التركيب:

بوفيدون أيودين (10%): محلول مائي يحتوي على بوفيدون أيودين	10 % (تعادل 1% يود حر)
بوفيدون أيودين (7.5%): محلول مائي يحتوي على بوفيدون أيودين	7.5 % (تعادل 0.75 % يود حر)
بوفيدون أيودين (5%): محلول مائي يحتوي على بوفيدون أيودين	5 % (تعادل 0.5 % يود حر)
بوفيدون أيودين (2%): محلول مائي يحتوي على بوفيدون أيودين	2 % (تعادل 0.20 % يود حر)
بوفيدون أيودين (1%): محلول مائي يحتوي على بوفيدون أيودين	1 % (تعادل 0.10 % يود حر)

الخواص:

- احد مركبات الايودوفور التي تمتاز بقوتها التطهيرية النافذة والعميقة والمميثة للبكتيريا وغيرها نظراً لانسباب اليود التدريجي.
- فعال ضد للبكتيريا والفيروسات والفطريات والاوليات (بروتوزوا) والخمائر والطحالب واصابة الجرب.
- يشكل على السطح المعالج طبقة تطهيرية رقيقة واقية.
- يحفز عملية التحيب واندمال الجروح.
- مأمون الاستعمال لانه غير ضار بالاعشية المخاطية والانسجة الرقيقة.
- لا يصبغ الجلد ولا يسبب تهيجه.

الاستعمالات:

- محلول 10%:
  - تطهير عام:
  - تطهير الجلد والجروح والحروق البسيطة ولسعات الحشرات وموقع السرة، للحيوان وكذلك تطهير المزارع والمفرخات والبيوت والاسطبلات والادوات وغيرها.
  - مكافحة الامراض الوبائية مثل: النيوكاسل والتهاب الشعبات والحمى القلاعية والبروسيل والسالمونيلا الخ...
  - معالجة الاصابات المهبلية من فطريات المونيليا والترايكوموناس وكذلك اصابات الجلد بالقراع وغيره من الفطريات.
- تخفيف بنسبة 7.5%:
  - تطهير الجلد قبل العمليات الجراحية او الحقن.
  - تطهير والادوات قبل العمليات الجراحية، وكذلك تطهير معدات الحلابة والمصانع.

- **تخفيف بنسبة 2%:**
  - تطهير الضرع والحلمات وقائياً، وكذلك في حالات التهاب الضرع وتقرح الحلمات.
  - للاستعمال داخل رحم الحيوان : يحقن 20 مل بعد يوم او يومين من عملية التلقيح الاصطناعي، كما يحقن 100 مل بعد الولادة بفترة 1-3 اسابيع، ثم يحقن 50 مل بعدها بثلاثة اسابيع.
- **تخفيف بنسبة 1%:**
  - تطهير اصابات الفم والحلق العادية والفطرية.
  - التطهير بواسطة التضييب داخل المزارع والاسطبلات والبيوت والمفرخات الخ....
- **تخفيف بنسبة 5 %:**
  - لتطهير مياه الشرب للمواشي والدواجن، ويتم ذلك بنسبة 100 مل لكل 200 لتر.

### تنبيهات:

- ضار للأسماك.
- يجب عدم خلطه مع اية مواد كيميائية اخرى.

### الاسعافات الاولية:

- **الابتلاع:**
  - يغسل الفم بالماء جيداً.
  - شرب كوبين من الماء.
  - تجنب اجراء التقبؤ.
- **ملامسة العيون:** تغسل بالماء لمدة لا تقل عن (15) دقيقة.
- **الاستنشاق:** ينقل المصاب الى الهواء الطلق، ويعطى الاوكسجين عند الضرورة.
- **تطلب المساعدة الطبية عند الضرورة.**

### تحذيرات:

- تجنب ملامسة العيون والفم والجلد والاستنشاق.
- تغسل العبوات الفارغة بالماء قبل التخلص منها.

### التخزين:

- يحفظ بعيداً عن متناول الاطفال، والطعام والشراب .
- يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 °م .

### العبوات:

- (100، 250، 500، 1000) مل.
- جالون 5 لتر.