

QUINOXAL КВИНОКСАЛ

Пероральный раствор

VARCO

противококцидиозные

СОСТАВ: Каждый мл содержит:

Сульфахиноксалин Натрия

250 мг

СВОЙСТВА:

- обладает антикокцидиальным действием и антибактериальной активностью против *Salmonella*, *Pasteurella*, *E.coli* и т. д.
- Он действует также против шизонтов второго поколения кокцидий.
- Он быстро, полностью поглощается и медленно выводится из организма.
- Из-за медленной скорости выведения из организма оказывает стойкое действие, направленное против кокцидий.

ПОКАЗАНИЯ: Для профилактики и лечения следующих инфекций:

- **Птица (цыплята, индюки, дичь):**
Кишечный и слепой кишки кокцидиоз, птичья холера, тиф птиц, бактериальный энтерит и понос.
- **Кролики:**
Печеночный и кишечный кокцидиоз, бактериальный энтерит и диарея.
- **Молодые жвачные животные:**
Кокцидиоз, пневмония, гниение ног, зимняя дизентерия, бактериальный энтерит и диарея.

ДОЗИРОВКА:

- **Лечение:**
 - **Птица, кролики:** 100 мл / 200 литров питьевой воды в течение 3 дней, затем дают простую воду только на 2 дня, после чего продолжать лечение еще 3 дня.
 - **Телята, ягнята, козлята:**
- **Начальная доза:** 1 мл / 5 кг массы тела на один день.
(25 мг активного вещества / кг массы тела)
- **Поддерживающая доза:** 0,5 мл / 5 кг. ежедневно в течение 3-4 дней.
(12,5 мг активного вещества / кг массы тела)
- **Профилактика:** половина дозы за тот же период.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА: Для потребления мяса: 7 дней.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Не рекомендуется использовать для кур-несушек и дойных животных.
- Обеспечить достаточное потребление воды во время лечения, чтобы уменьшить риск возникновения кристаллов.
- Не давать в случаях инфекции Гамборо, тяжелой печеночной или почечной дисфункции.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Настоятельно рекомендуем использовать Неомицин или Колистин (600, 80) в течение 3-5 дней вместе с Кайноксал для лечения вторичной инфекции кишечника, вызванной кокцидиозом.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30 ° C.

УПАКОВКА: (100, 250, 500, 1000) мл.