

كينوكزال

محلول للشرب

التركيب: كل مل يحتوي على:

سلفاكينوكزالين صوديوم 250 ملغم

الخواص:

■ السلفاكينوكزالين:

- فعال ضد الكوكسيديا وبكتيريا السالمونيلا والباستريلا والكولاي وغيرها ، كما انه يؤثر على مرحلة الشيزونت الثانية للكوكسيديا.
- امتصاصه سريع وتام من الامعاء مع ببطء اطراحه من الجسم ، الامر الذي يجعله ذا مفعول مطول مما يعزز فعاليته ضد الكوكسيديا.

الإستطبابات:

- للمعالجة والوقاية من الاصابات التالية:
 - الدواجن (الدجاج، الحبش، الطيور البرية، الفزان، الفري الخ): الكوكسيديا المعوية والاعورية، كوليرا الطيور، تيفويد الطيور، النزلات المعوية والاسهالات البكتيرية.
 - الارانب: الكوكسيديا المعوية والكبدية، النزلات المعوية والاسهالات البكتيرية.
 - المجترات الصغيرة: الكوكسيديا، الالتهاب الرئوي، تعفن الظلف، الدوزنتاريا الشتوية، النزلات المعوية والاسهالات البكتيرية.

الجرعات:

■ المعالجة:

- الدواجن والارانب: 100 مل لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة ثلاثة ايام، ثم يعطى الماء فقط لمدة يومين متتاليين ، ثم تستمر المعالجة لمدة ثلاثة ايام اخرى.
- العجول والحملان والسخول:
 - الجرعة الاولى: 1 مل / 5 كغم وزن جسم ولمدة يوم واحد.
 - (25 ملغم مادة فعالة / كغم وزن جسم).
 - الجرعة الاستمرارية: 0.5 مل / 5 كغم وزن جسم يومياً لمدة 3-4 ايام.
 - (12.5 ملغم مادة فعالة / كغم وزن جسم).

■ الوقاية:

- نصف الجرعة العلاجية للمدة نفسها.

فترة الامان:

- لاستهلاك اللحوم: اسبوع.

تحذيرات:

- لا يعطى للقطعان البيضاء او للحيوانات الحلابة.
- لا يعطى في حالة اصابات الكبد والكلى الجمبورو.
- اثناء المعالجة ، يجب تزويد القطعان بكميات كافية من ماء الشرب ، تجنباً لتبلور وترسب السلفا في جسم الحيوان .

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات: (100، 250، 500، 1000) مل.