

RAFOMECTIN РАФОМЕКТИН

Раствор для инъекций
Для овец, коз, крупного рогатого скота,
буйволов, верблюдов

СОСТАВ: Каждый мл содержит:

Ивермектин	10 мг
Рафоксанид	125 мг

VARCO

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
глистогонное средство

СВОЙСТВА:

ИВЕРМЕКТИН:

- Ивермектин, производное авермектина, является высокоэффективным и безопасным препаратом против внутренних и внешних паразитов у животных.
- Он действует, стимулируя высвобождения химических нейромедиаторов (габа-гамма-аминомасляной кислоты), прерывая нервные импульсы, которые парализуют паразита и убивают его.
- Он характеризуется быстрым распределением и продолжительным периодом выведения, обеспечивающим длительный паразитарный эффект.

РАФОКСАНИД:

- Галогенированный салициланилид, противогельминтный препарат против нематод (сосальщики и круглые черви) и личиночных стадий носового бота у овец.
- Он интенсивно связан с белками плазмы и имеет длительный конечный период полувыведения, поэтому он приобретает длительную стойкость в плазме, что приводит к эффекту против трематод.
- Как протонный ионофор, переносящий катионы через клеточные мембраны, он действует путем разобщения окислительного фосфорилирования в паразитных митохондриях.

ПОКАЗАНИЯ: для лечения и контроля над следующим паразитами:

• ЭНДОПАРАЗИТЫ:

- Желудочно-кишечные нематоды (круглые черви): *heamonchus*, *chabertia*, *ostertagia*, *nematodirus*, *trichuris*, *cooperia*, *bunostomum*, *strongyloides*, *oesophagostomum*, *trichostrongylus*, *toxocara*, *parafilaria*, *hyostrongylus*, *ascaris suum*.
- Лунные черви: *dictyocaulus*, *protostrongylus*, *metastrongylus*.
- Трематоды: трематоды печени (зрелые и незрелые стадии): *fasciola hepatica*, *f.gigantica*.
- Другие трематоды: Ланцетовидная Двуустка.
- Личинки мух: овечий носовый бот: (*oestrus ovis*), личинки.

• **ЭКТОПАРАЗИТЫ:**

- Миазы (личинки кожного овода у крупного рогатого скота): *Hypoderma bovis*, *H. Lineatum*
- Миазы (тропические личинки у крупного рогатого скота): *Dermatobia hominis*.
- Миазы (вихревая муха): (Паразитическая стадия) *Chrysoma bezziana*.
- Чесоточные клещи: *Sarcoptes*, *Psoroptes*, *Chorioptes*.
- Сосущие вши: *Linognatus*, *Haematopinus*, *Solenoptes*.
- Кусаящие вши: *Damalina*.
- Клещи.
- Глазные черви: *Thelazia*.

ДОЗИРОВКА: одноразовая терапия.

- Овцы, козы, крупный рогатый скот, буйволы, верблюды: 1 мл / 50 кг массы тела (подкожная инъекция).
- Для мелких жвачных животных (более 100 кг массы тела) дают дополнительные 0,5 мл на каждые 25 кг массы тела.
- При тяжелых инвазиях повторить дозу через неделю после первой обработки.
- Для лечения чесотки, коз и верблюдов: вторую дозу следует вводить через 7 дней (для овец и коз) и через 15 дней (для верблюдов).
- Не вводить более 10 мл в одном месте инъекции. Дозу можно разделить.

Срок выведения препарата: Для потребления мяса и молока: 28 дней.

Внимательно прочитайте примечания перед использованием:

- Не использовать для кормящих животных или в течение 28 дней до родов.
- Может возникать локальная реакция (раздражение и отек) в месте инъекции.
- Лечение крупного рогатого скота следует применять после окончания летнего сезона.
- Клостридиальную вакцинацию проводят для овец до периода дегельминтизации.

Меры предосторожности:

- Мыть руки после использованием.
- Избегать контакта с глазами и кожей.
- Не курить и не есть во время нанесения
- Не загрязнять водоемы, каналы и источники воды.
- Пустые контейнеры следует безопасно удалять.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить отдельно от продуктов питания, напитков и детей.
Хранить в сухом, темном месте ниже 30 °С.

УПАКОВКА: (50, 100) мл.