

# **ROVER-50%**

# **РОВЕР-50%**

**ФУНГИЦИД**  
**СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК**

**Класс:**  
Dicarboximide

**Контактный фунгицид защитного и лечебного действия, контролирует распространение и развитие многих грибковых заболеваний на самых разных сельхозкультурах.**

**СОСТАВ:** Каждый кг содержит:

**ИПРОДИОН**

**50% вес / вес (активного вещества)**

**СВОЙСТВА:**

**РОВЕР-50%:** контактный фунгицид с защитным и лечебным действием, препятствует прорастанию спор и росту грибкового мицелия.

**РОВЕР-50%:** контроль гнили, пятнистости и лечебный эффект на самых разных сельхозкультурах.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:**

<b>КУЛЬТУРА</b>	<b>ЗАБОЛЕВАНИЕ</b>	<b>НОРМА РАСХОДА мл / 20 л ВОДЫ</b>	<b>БЕЗОПАС- НЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)</b>
<b>Косточковые деревья: персик, абрикос, вишня,nectарины, сливы и чернослив.</b>	Порча, бурая гниль, дырчатая пятнистость, пятнистость листьев, гниль плодов, парша	20 – 30	15
<b>Клубника</b>	Серая гниль, гниль стеблей, мягкая гниль, антракноз, Ризоктониоз	20 – 30	3
<b>Виноград</b>	Сгусток гнили	20 – 30	7
<b>Миндаль</b>	Порча, бурая гниль, дырчатая пятнистость	22	----
<b>Малина сорта Caneberries</b>	Фруктовая серая гниль ( <i>Botrytis cinerea</i> )	22 - 44	0
<b>Арахис</b>	Склеротиниоз	44	10

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мер безопасности.

<b>Картофель</b>	Ранняя гниль, белая гниль	20 – 30	14
<b>Морковь</b>	Альтернариоз, гниль черная корона	22 - 44	0
<b>Салат</b>	Опадение листьев, гниль основания	33 - 44	14
<b>Брокколи</b>	Черная ножка	44	0
<b>Китайская горчица</b>	Альтернариоз листьев	22	10
<b>Фасоль (обычная, сухая, Лима)</b>	Серая плесень, белая плесень	26 - 44	14
<b>Чеснок (одно применение / сезон)</b>	Склеротиниоз	20 – 30	2
<b>Сухой луковичный лук</b>	Альтернариоз листьев	22	10
<b>Рапсовые</b>	Склеротиниоз	20 - 30	---
<b>Газонные растения</b>	Долларовая пятнистость	90	21
	Бурая пятнистость	120 – 250	
	Пятнистость листьев	120	
<b>Декоративные растения</b>	Серая плесень ( <i>Botrytis spp.</i> )	20	---

#### **ВНИМАНИЕ:**

Использовать только на вышеупомянутых культурах с соблюдением рекомендованного периода безопасности перед уборкой урожая.

#### **ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:**

Через 48 часов после последнего применения.

#### **СОВМЕСТИМОСТЬ:**

Совместим с большинством пестицидов, перед использованием нербзодимо проводить проверку на совместимость.

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мер безопасности.