

رافوكسين

سائل معلق للتجريع

طاراد الديدان للضأن والماعز والابقار

التركيب: كل مل يحتوي على:

30 ملغم

رافوكسانيد

الخواص:

- الرافوكسانيد (مجموعة الساليسلانيليد الهالوجينية)، طاراد الديدان الفعال ضد الديدان المفلطة وبعض الديدان الاسطوانية (المستديرة/النيماتود)، والمراحل اليرقية لذبابة نغف الانف في الضأن.
- نظراً لامتناعه الجيد وبطء اطراحه مما يجعله يرتبط طويلاً ببلازما الدم، وبالتالي يكتسب فترة (نصف عمرية) مطولة، الامر الذي يؤدي الى فاعلية وتأثير علاجي ضد المراحل غير البالغة للديدان.
- تعتمد طريقة عمله على كونه مركب (بروتون - ايونفور)، حيث تقوم الهوابط (الكاتيونات) الناتجة عن التحلل الكيميائي للمادة الفعالة باختراق جدران خلايا الديدان، ومن ثم فك ترابط عملية الفسفرة التأكسدية داخل الميتاكوندريا في الديدان، الامر الذي يؤدي الى موتها.

الإستطابات:

- معالجة ومكافحة الاصابات التالية:
 - ديدان الكبد (المراحل البالغة واليرقية): الفاشيولا بنوعيهما.
 - ديدان الكبد الاخرى: (ديدان شبيهة الرمح): دايكروسيليوم دنرتكم.
 - الديدان الاسطوانية (المستديرة/ النيماتود) الماصة للدم: هيمونكس كونتورتس في الضأن.
 - اليرقات الذبابية: نغف الانف (اوسترس اوفيس) في الضأن، لوسيليا.

الجرعات:

- ترج العبوة جيداً قبل الاستعمال.
 - ضأن، ماعز، ابقار: 2.5-4 مل/10كغم وزن جسم.
 - (7.5 ملغم فعالية/كغم وزن جسم).
- تكرار المعالجة بعد 4 - 6 أسابيع.

فترة الامان:

- لاستهلاك اللحوم: 28 يوماً.

تنبيهات:

- لا يعطى للحيوانات الحلابة.
- تعالج الحيوانات الحلابة خلال فترة جفافها من الحليب.

تحذيرات:

- يجب غسل الايدي بعد اجراء التجريع.
- تجنب ملامسة العيون والفم والجلد.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 °م.

العبوات: (100، 250، 500، 1000) مل.