

ريناميد - 5 %

محلول للحقن

مدر للبول

التركيب: كل مل يحتوي على:

50 ملغم

فيوروساميد

الخواص:

- مدر للبول قوي وسريع المفعول.
- يزيد من افراز الماء وعنصر الصوديوم من الجسم، وبدون تأثير على البوتاسيوم.
- فعال حتى في حالات ارتشاح وتلف الكبيبات الكلوية.

الاستطابات:

- للأبقار والخيول والكلاب والقطط والخنزير.
- استسقاء الضرع والمنطقة الشرجية في الأبقار والافراس عند الولادة.
- استسقاء الصفن (وعاء الخصية) في ذكور الحيوانات.
- المعالجة الداعمة للتخلص من استسقاء القفص الصدري والبطني والقلبي والرئوي والمفصلي والوتار.
- المعالجة الداعمة بحالات العرج والشلل في الخيول.
- الاستسقاء نتيجة نقص البروتين في الجسم لوجود مادة الزلال في الجهاز البولي، واضرار الكبد المتسبب عن خلل عملية الاستقلاب (الايض) واصابات الطفيليات، وسوء التغذية.
- الاستسقاء الجلدي نتيجة تضرر الاوعية الدموية والتسمم والكدمات والحساسية والرضوض والجروح والتهاب الجلد والجراحة.

الجرعات:

- يعطى حقناً بالعضل او بالوريد ببطء.
- الخيول: 5 - 10 مل مرة او مرتين يومياً كل (6-8) ساعات.
- الأبقار: 10 مل مرة واحدة او (5) مل مرتين كل (6-8) ساعات.
- الكلاب والقطط: 0.25 - 0.50 مل/ 5 كغم وزن جسم مرة او مرتين يومياً كل (6-8) ساعات.
- الخنازير: 1 مل/ 10 كغم وزن جسم مرة واحدة (او تحدد حسب خبرة الطبيب المعالج).

فترة الامان:

- لاستهلاك اللحوم والحليب: يومان.

تنبيهات:

- لا يستعمل في حالات الفشل الكلوي وقلة البول وانقطاعه، والتهاب الكلى الحاد، ونقص الاملاح في الجسم، والجرعات الزائدة لمادة الديجتالس.
- احتمال حدوث ضعف التأثير العلاجي بسبب زيادة استهلاك الماء.
- زيادة الادرار البولي مع تناول محلول كلوريد الصوديوم.
- احتمال حدوث تشنجات في حالة نقص الكالسيوم لدى الحيوان.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 °م.

العبوات: (50، 100) مل.