

SELFAT-53.5%

СИЛФАТ-53.5%

Класс:
Inorganic compound ⁽¹⁾
Dithiocarbamate ⁽²⁾

ФУНГИЦИД СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК

Контактный фунгицид для обработки литвы, оказывает профилактическое действие. Используется для борьбы со многими грибковыми заболеваниями, такими как: ложная мучнистая роса, гниль, пятнистость листьев и парша.

СОСТАВ: Каждый кг содержит:

ОКСИХЛОРИД МЕДИ ⁽¹⁾
ЗИНЕБ ⁽²⁾

37,5% вес / вес (активного вещества)
16% вес / вес (активного вещества)

СВОЙСТВА:

СИЛФАТ-53,5%: Контактный фунгицид для обработки литвы, оказывает профилактическое действие. Необходимо обрабатывать урожай до момента прорастания грибковых спор.

СИЛФАТ-53.5%: использовать для борьбы со многими грибковыми заболеваниями, такими как: ложная мучнистая роса, гниль, пятнистость листьев и парша.

СИЛФАТ-53,5%: не фитотоксичен, за исключением чувствительных к цинку растений, таких как табак и кукуруза, и может вызывать повреждение листвы у сливы и персика, особенно при низких температурах.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ЗАБОЛЕВАНИЕ	НОРМА РАСХОДА мл / 20 л ВОДЫ	БЕЗОПАС НЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Кабачок, Огурцы, Тыква, Арбуз	Антракноз, ложная мучнистая роса.	40 – 60	3
Картофель	Фитофтороз, Альтернариоз, Антракноз, ложная мучнистая роса	50	7
Помидоры	Фитофтороз, ложная мучнистая роса	40 – 60	7
Пасленовые	Антракноз, ложная мучнистая роса	40 – 60	3

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мер безопасности.

(баклажаны, сладкий перец, перец чили (но не черный перец), табак и петуния)			
Овощи Крестоцветные (капуста, брюссельская капуста, цветная капуста, редька и брокколи)	Альтернариоз, ложная мучнистая роса	40 – 60	28
Чеснок, лук, лук-шалот, ароматические травы и хмель.	Ложная мучнистая роса.	40 – 60	15
Салат-латук, лук-порей	Ложная мучнистая роса.	40 – 60	21
Марковь	Альтернариоз, ложная мучнистая роса	40 – 60	15
Сельдерей	Ложная мучнистая роса, Септориоз	40 – 60	21
Фруктовык деревья	Парша, пятнистость листьев	60 – 80	15
Цитрусовые деревья	Гниль основания, Альтернариоз, Цитрусовый бактериоз, сажковая плесень.	40 – 60	15
Персики, нектарины, сливы, абрикосы, вишня	Некроз, Бурая гниль.	40 – 60	28
Семечковые деревья (яблоко, груша, айва)	Бурая гниль, парша	40 – 60	28
Винные деревья	Антракноз, ложная мучнистая роса	40 – 60	15
Нут	Охряная пятнистость (Аскохитоз)	40 – 60	15
Зеленый горошек	Антракноз, ложная мучнистая роса	40 – 60	21
Зерновые бобы	Альтернариоз, Антракноз, ржавчина	40 – 60	21
Зеленая фасоль	Антракноз, ложная мучнистая роса	40 – 60	21

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мер безопасности.

Сахарная свекла	Листовая пятнистость	4 – 6 кг / Га	28
Оливковые деревья	Оливковая пятнистость (павлиний глаз)	40 – 60	15

ВНИМАНИЕ:

Использовать только на выше указанных культурах с соблюдением рекомендованного безопасного периода перед сбором урожая.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

Через 48 часов после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с наиболее распространенными пестицидами, но перед использованием рекомендуем проводить проверку на совместимость.

- **Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мер безопасности.**