Класс:

Mite Growth inhibitor

SPIDERON-10%
СПАЙДЕРОН-10%

АКАРИЦИД
СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК

Несистемный акарицид контактного действия, используемый для борьбы со многими видами клещей; обладает длительной остаточной активностью.

СОСТАВ: каждый килограмм содержит:

ГЕКСИТИАЗОКС	**10% вес / вес (активного вещества)**

СВОЙСТВА:
СПАЙДЕРОН-10%: Несистемный акарицид контактного действия.
СПАЙДЕРОН-10%: Высокоэффективен в борьбе с незрелыми подвижными стадиями травоядных клещей, которые способны перемещаться на обработанные поверхности.
СПАЙДЕРОН-10%: Обеспечивает расширенный остаточный контроль вредных видов клещей без вреда для полезных насекомых.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА МЛ/ 20 Л ВОДЫ	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Цитрусовые	Европейский красный паутинный клещ.	8 - 10	7
Яблони, груши	Европейский красный паутинный клещ, двупятнистый паутинный клещ	8 - 10	7
Персики, абрикосы, сливы, вишни, нектарины	Европейский красный паутинный клещ.	8 - 10	7
Виноград	Европейский красный паутинный клещ.	8 - 10	7

Клубника	Европейский красный паутинный клещ.	8 - 10	1
Огурцы, кабачок, дыни, тыква	Двупятнистый паутинный клещ.	8 - 10	7
Помидоры, баклажаны, перец, горох	Двупятнистый паутинный клещ.	8 - 10	1
Фасоль	Европейский красный паутинный клещ.	8 - 10	14
Кукуруза	Двупятнистый паутинный клещ.	8 - 10	14
Хлопок	Двупятнистый паутинный клещ.	8 - 10	14
Индир	Двупятнистый паутинный клещ.	8 - 10	1
Декоративные растения	Европейский красный паутинный клещ.	8 - 10	-----

ВНИМАНИЕ:

Используется только на вышеупомянутых культурах с соблюдением рекомендованного периода безопасности перед уборкой урожая.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

Не использовать обработанное поле до 24 часов от последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:
Совместим с большинством распространенных пестицидов; раствор использовать сразу после смешивания, и желательно привести тест перед распылением.

• *Для получения дополнительной информации о первой помощи и мерах предосторожности обратитесь к указателю первой помощи и мерах предосторожности.*