

SPORNEB-70%

СПОРНЕБ-70%

ФУНГИЦИД

Класс:
Dithiocarbamate

СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК

Контактный фунгицид, оказывает защитное действие против многих грибковых заболеваний на самых разных сельхозкультурах.

СОСТАВ: Каждый кг содержит:

ПРОПИНЕБ

70% вес / вес (активного вещества)

СВОЙСТВА:

СПОРНЕБ-70%: Защитный фунгицид оказывает действие при контакте с растением, контролируя многие грибковые заболевания.

СПОРНЕБ-70%: защитный фунгицид широкого спектра действия для борьбы с различными грибковыми патогенами, особенно с Оомицетами, Аскомицетами, Базидиомицетами.

СПОРНЕБ-70%: для контроля синей табачной плесени, ранней гнили и фитофторы у картофеля и томатов, серой листовой пятнистости томатов, мучнистой росы у тыквенных и лука, черной пятнистости на citrusовых и некоторых других заболеваний у сельхозкультур.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ЗАБОЛЕВАНИЕ	НОРМА РАСХОДА мл / 20 л ВОДЫ	БЕЗОПАСН ЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Помидоры	Ранняя гниль и фитофтороз, пятнистость листьев.	40 - 60	7
Картофель	Ранняя гниль и фитофтороз.	50 - 80	7
Лук, бобы, салат	Ложная мучнистая роса, плесень, ржавчина и антракноз.	40 - 60	7
Мускусная дыня, огурец.	Ложная мучнистая роса (теплица).	20	7
Чили перец	Отмирание	70	10
Сельдерей	Септориоз	40	7
Спаржа	Ржавчина	30 - 60	30

Яблоко, груша	Парша (до и после цветения)	40	14
Виноград	Ложная мучнистая роса, черная гниль, Краснуха, серая плесень	42	7
Цитрусовые	Черная пятнистость, ржавчина	40	7
Манго	Пятнистость листьев, мучнистая роса	7 - 8	7
Гранат	Пятнистость листьев, пятнистость плодов	42	10

КУЛЬТУРА	ЗАБОЛЕВАНИЕ	СКОРОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ гм/ 20 л ВОДЫ	БЕЗОПАСН ЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Кофе	Ржавчина	30 - 50	7
Какао	Отмирание сосудов	30 - 50	7
Рис	Бурая пятнистость, Ризоктониоз	30 - 50	7
Табак	Ложная мучнистая роса (Распылять в питомниках два раза в неделю, в поле распылять один или два раза, если необходимо)	20- 40	14
Декоративные растения	Пятнистость листьев, ржавчина	30 - 40	----

ВНИМАНИЕ:

- Использовать только на вышеуказанных культурах и соблюдать рекомендованный безопасной период перед уборкой урожая.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

Через 24 часа после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с большинством других пестицидов предполагает наличие высокощелочного соединения.

*** ДРУГОЕ ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: PROPICONE-70% WP**

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мер безопасности.