

SULPHADIMIDINE Na СУЛЬФАДИМИДИН Na

Сульфамезатин / Сульфаметазин
Водорастворимый порошок

VARCO

сульфаниламидные
препараты

СВОЙСТВА:

- Эффективного антибактериальное средство против некоторых грам-положительных и грам-отрицательных бактерий (E.coli, Staph, Strept, Salmonella, Pasteurella и т.д.), а также против некоторых риккетсий и простейших организмов.
- Быстро и полностью всасывается и медленно выводится через мочевыводящие пути, поэтому активен при лечении инфекций мочевых путей.

ПОКАЗАНИЯ:

- **Птица:** пулорум, насморк, птичья холера, кокцидиоз, энтерит, диарея.
- **Кролики:** кокцидиоз, пастереллез, пневмония, энтерит, диарея.
- **Овцы, козы:** геморрагический сепсис (пастереллез), кокцидиоз, пневмония, энтерит, диарея, метрит.
- **Крупный рогатый скот:** гниение ног, кокцидиоз, колибактериоз, метрит, энтерит, диарея, дифтерия телят, телята, геморрагический сепсис (пастереллез), пневмония.
- **Непарнокопытные:** душит, пневмония, пастереллез, энтерит, диарея, метрит, колибактериоз, совместные болезни у жеребят.
- **Собаки, кошки:** пневмония, энтерит, диарея, носовой катар, кокцидиоз, вторичные осложнения от смуты.

ДОЗИРОВКА:

- **Птица:** 400 г на 200 литров питьевой воды в течение 3-5 дней.
- **Различные животные:**
 - Начальная доза: 0,2 г / кг массы тела перорально с водой в течение одного дня.
 - Дозировка для поддержания: 0,1 г / кг массы тела перорально с водой в течение 3-5 дней.
- **С кормом:** 4 кг на тонну за тот же период.

СРОК ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА:

- Для потребления мяса: 7 дней.
- Для потребления молока: 4 дня.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Не рекомендуется в случаях печеночной и почечной недостаточности.
- Обеспечить достаточное потребление воды во время лечения, чтобы уменьшить риск возникновения кристаллов.
- Избегать лечения более 5 дней.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте ниже 30 °C.

УПАКОВКА: (100, 250, 500, 1000) г.