

سلفاديمدين صوديوم (دستوري)

(سلفاميثازين / سلفاميثازين)

بودرة قابلة للذوبان في الماء

الخواص:

- الصاد البكتيري الفعال ضد بعض البكتيريا ذات صبغة جرام الايجابية والسلبية (الكولاي والمكورات العنقودية والعقدية والسالمونيلا والباستريلا وغيرها...) وكذلك ضد بعض انواع الركتسيا والبروتوزوا.
- يتم امتصاصه كاملاً ويسرعة من الجهاز الهضمي واطراحه من الجسم يتم ببطء ومن خلال الجهاز البولي مما يزيد من فعاليته.

الإستطبابات:

الدواجن:

- الاسهال الابيض، الرشح المعدي (كورايزا)، كوليرا الطيور، كوكسيديا الاعورين، النزلات المعوية والاسهالات.

الارانب:

- الكوكسيديا، رشح الارانب (باستريلا)، الالتهاب الرئوي، النزلات المعوية والاسهالات.

الضأن والماعز:

- الالتهاب الرئوي، الكوكسيديا، الانتان الدموي (باستريلا)، النزلات المعوية والاسهالات، التهاب الرحم.

الابقار:

- الالتهاب الرئوي، الانتان الدموي (باستريلا - حمى الشحن)، تعفن الظمف، الكوكسيديا، اصابات الكولاي، التهاب الرحم، النزلات المعوية والاسهالات، دفتيريا العجول، اسهالات العجول.

الخيول:

- خناق الخيل، الالتهاب الرئوي، اصابات الباستريلا والكولاي، النزلات المعوية والاسهالات، التهاب الرحم، اصابات المفاصل والسرته في الامهر.

الكلاب والقطط:

- الالتهاب الرئوي، النزلات المعوية والاسهالات، رشح القطط، الكوكسيديا، مضاعفات طاعون القطط.

الجرعات:

- الدواجن: 400 غم لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3-5 ايام.

الحيوانات المختلفة:

- جرعة الابتدء: 0.2 غم / كغم وزن جسم مع ماء الشرب ولمدة يوم واحد.
- جرعة الاستمرار: 0.1 غم / كغم وزن جسم مع ماء الشرب لمدة 3-5 ايام.
- بالعلف: 4 كغم لكل طن ولمدة 3-5 ايام.

فترة الأمان:

- لاستهلاك اللحوم: اسبوع.
- لاستهلاك الحليب: 4 أيام.

تنبيهات:

- لا يعطى في حالات الإصابة بأمراض الكبد والكلى.
- أثناء المعالجة، يجب توفير ماء الشرب بشكل كافٍ لتجنب تبلور وترسب السلفا في جسم الحيوان.
- تجنب المعالجة لأكثر من خمسة أيام.
- تجنب معالجة القطعان البيضاء.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات: (100، 250، 500، 1000) غم.