

VAPCO

АНТИГЕЛЬМИНТЫ

ТЕТРАМИСОЛЕ – 30 ТЕТРАМИЗОЛ - 30

Водорастворимый порошок

Безопасный антигельминт широкого спектра действия, используемый в животноводстве

СОСТАВ: Каждый грамм содержит:

Тетрамизол HCl 300 мг

СВОЙСТВА:

- Тетрамизол представляет собой мощный антигельминт широкого спектра действия (имиодиазольная группа) против нематод (круглых червей) желудочно-кишечного тракта и легочных червей жвачных животных.
- Тетрамизол в терапевтической дозе безопасен даже для беременных животных.
- Оказывает противогельминтное действие, парализуя нематоду. Паралич обусловлен устойчивым мышечным сокращением, которое приводит к нейро-мышечному параличу паразитов.

ПОКАЗАНИЯ:

Для лечения и контроля паразитарного гастроэнтерита и паразитарного бронхита, вызванного круглыми червями (нематодами):

- **Жвачные животные, Кролики:**
 - Желудочно-кишечные черви: аскариды, нематоды, гемонкус, остертагия, куперия, власоглав, стронгилиды.
 - Легочные черви: *Dictyocaulus*.
- **Птица:** аскариды, капиллярии, амидостомы, нематоды (*Heterakis*).

ДОЗИРОВКА:

- Подавать с водой или кормом.
- Давать разовую дозу каждый раз.
- **Овцы, козы, крупный рогатый скот, верблюды:** 0,5 г на 10 кг массы тела.
(15 мг активного вещества / кг массы тела).
Повторять для профилактики каждые 4-6 месяцев.
- **Птица, голуби:** 0,06 г на кг массы тела.
(20 мг активного вещества / кг массы тела).
Повторять каждые 3 месяца.
- **Кролики:** 0,06 г / кг массы тела. (20 мг активного вещества / кг массы тела.)
Повторять дважды в год.

Время выведения препарата:

- Для потребления мяса и яиц: 7 дней.
- Для потребления молока: 1 день.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Органофосфатные инсектициды являются токсичными, если их применять в течение (14) дней лечения.
- Избегать лечения ослабленных или больных животных.
- Иногда у некоторых животных возникает слюноотделение, легкая диарея и кашель.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте ниже 30 °C.

УПАКОВКА: (100, 250, 500, 1000) г.