

ТОСОВИТ – S ТОКОВИТ- С

Раствор для инъекций

СОСТАВ: Каждый мл содержит:

Витамин Е Ацетат	80 мг
------------------	-------

Селенит натрия	1,6 мг
----------------	--------

СВОЙСТВА:

- **Витамин Е:**
 - Важен для правильной работы сердечной мышцы.
 - Принимает участие в клеточном метаболизме как антиоксидант.
 - Усиливает работу иммунных механизмов и повышает устойчивость организма к инфекциям.
- **Селен (Se):** необходим для роста и размножения.
- Комплекс **Витамина Е и селена** используют для лечения и профилактики заболеваний, вызванных дефицитом витамина Е и селена в организме животных и птицы.

ПОКАЗАНИЯ:

Профилактика и лечение синдрома дефицита витамина Е и селена:

- Скелетные и сердечные мышцы (пищевая мышечная дистрофия / пищевая миопатия) у ягнят, козлят и телят:
 - Беломышечная болезнь у ягнят.
 - Энзоотическая мышечная дистрофия у телят.
 - свиньи :
 - * Болезнь сердца Малберри (энзоотическая болезнь сердца) из-за крайней дегенерации миокарда.
 - * диетический гепатоз.
- Снижение жизнеспособности, нарушение роста, снижение иммунитета.
- Во время беременности, чтобы помочь предотвратить синдром дефицита у новорожденных животных.
- Лечение репродуктивных нарушений у мужчин и женщин, таких как:

VARCO

**ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ВИТАМИНЫ**

- Бесплодие, сохраненение плаценты, кисты яичников, привычный аборт, эмбриональная смерть.
 - олигоспермия, депрессия.
- Экссудативный диатез, артрит, некроз печени.

ДОЗИРОВКА: вводить путем внутримышечной или подкожной инъекции.

- **Ягнята, Козлята:**
 - Новорожденный: 0,5 мл на одно животное.
 - Старшие животные: 0,5-1 мл на животное.
- **Телята:** 1-2 мл на 45 кг массы тела.
- **Свиньи:** 1 мл на 25 кг массы тела.
- повторить выше указанные дозы через 2-4 недели, если это необходимо.
- **Внутриутробно:** для защиты новорожденных ягнят, козлят и телят от дефицита витамина Е и Se:
 - **Овцы, козы:** на (3) месяце беременности: 2 мл на 50 кг массы тела.
 - **Коровы:** на (5) месяце беременности: 2 мл на 50 кг массы тела.
 - повторить дозу, если необходимо, для овец, коз и коров с интервалом не менее 2 недель и максимальной дозой (4).

ВРЕМЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА:

- Для потребления мяса: 14 дней.
- Для потребления молока: 5 дней.

Внимательно прочитайте примечания перед использованием:

- Не превышать рекомендуемую дозу.
- Не использовать для лактации молочного скота.
- Возможны эпизодические анафилактические реакции. В таком случае немедленно назначьте адреналин.

ХРАНЕНИЕ :

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Хранить в сухом, темном месте ниже 30 °С.

УПАКОВКА: (50, 100) мл.