

ТОВАР-30% ТОВАП-30%

Класс:
Арилоксифеноксипропионаты ⁽¹⁾
Антидот ⁽²⁾

ГЕРБИЦИД КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ

Селективный системный гербицид, используемый для контроля развития дикого овса, канареечника и однолетнего плевела на пшеничных полях.

СОСТАВ: каждый литр содержит:

КЛОДИНАФОП-ПРОПАРГИЛ ⁽¹⁾

24% вес / объем
(активного вещества)

КЛОХИНТОЦЕТ-МЕКСИЛ ⁽²⁾

6% вес / объем
(активного вещества)

СВОЙСТВА:

ТОВАП-30%: Селективный системный гербицид следует применять только при активном росте сорняков.

ТОВАП-30%: контролирует развитие дикого овса, канареечника и однолетнего плевела на пшеничных полях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА:

КУЛЬТУРА	СОРНЯК	НОРМА РАСХОДА / ГЕКТАР	ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ
Пшеница на стадии 2х листьев до позднего колошения	Дикий овес	65 мл + 1 литр липких материалов / 100 л воды.	Когда сорняки имеют от 2х до 5 листьев
		85 мл + 1 литр липких материалов / 100 л воды.	Когда сорняки имеют от 2х листьев до середины стадии кущения
	Канареечник	85 мл + 1 литр липких материалов / 100 л воды.	Когда сорняки на стадии 2 до 3 листьев
		125 мл + 1 литр липких материалов / 100 л воды.	Когда сорняки на стадии от 2х до 5 листьев
		160 мл + 1 литр липких материалов / 100 л воды.	Когда сорняки имеют от 2х листьев до ранней стадии кущения
	Однолетний плевел	160 мл + 1 литр липких материалов / 100 л воды.	Когда сорняки имеют от 2х до 4х листьев

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

		210 мл + 1 литр липких материалов / 100 л воды.	Когда сорняки на стадии от 2х листов до ранней стадии кущения Гектар = 10000 м ²
--	--	---	--

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Перед применением необходимо провести калибровку опрыскивателя.
- Необходимо обеспечить полное покрытие во время распыления.
- Не применять, если в течение 2 часов ожидается дождь.
- Не применять для культур, которые находятся в состоянии стресса. Например, из-за очень сухих, очень влажных, морозных или болезненных условий, недостатка питательных веществ или высокого давления насекомых.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

- Перед распылением сделать пробное смешивание.
- Если **ТОВАП-30%** применять с совместимыми гербицидами, всегда следует использовать рекомендуемый клейкий продукт.
- Известно, что следующие гербициды несовместимы с **ТОВАП-30%**:
Диурон, Триасул-фурон (бромоксинил + дикамба + МСРА) и все 2,4-D препараты. Гербициды, несовместимые с **ТОВАП-30%**, должны применяться отдельно. Применять эти гербициды следует через 10 дней после последней обработки **ТОВАП-30%**.
- **ТОВАП-30%** совместим с **УЛЬТРАЦИДИНОМ-40%**.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.