

TYLOSIN-100%

ТИЛОЗИН – 100%

Водорастворимый порошок
Для домашней птицы, индейки, голуби

VARCO
АНТИБИОТИКИ

СОСТАВ: Каждый 113 г содержит:

Тилозин (Тилозин Тартрат)

100 г

СВОЙСТВА:

- Тилозин в качестве сильного макролидного антибиотика охватывает широкий спектр грам-положительных бактерий, таких как: Стафилококк, Стрептококк, Корине, Диплококк, Клостридии и другие бактериальные инфекции, вторичные по отношению к вирусным заболеваниям.
- Очень эффективен против микоплазмозов и влияет также на некоторые виды риккетсии (групповой пситтакоз-хламидиоз) и гемофилов.
- Некоторые грам-отрицательные бактерии (*Pasteurella*, *Campylobacter*) также чувствительны к тилозину.

ПОКАЗАНИЯ:

- Для профилактики и лечения: Микоплазмоз, хронические респираторные инфекции, воздушный суккулит, инфекционный синовит, инфекционный синусит, Хламидиоз, Спирохэтоз.
- Условия стресса, вызванные вакцинацией, дебакированием, транспортировкой, повторным посещением, изменениями корма и погодой.

ДОЗИРОВКА:

■ Подготовка раствора: добавить 4 литра воды к Тилозин 100% (**соблюдать последовательность!**) и растворить хорошо, затем добавить в резервуар для воды.

■ Лечение:

• Респираторные или общие инфекции у домашней птицы: (0,05% раствор) 100 г (активного вещества) на 200 литров воды в течение 3-5 дней в зависимости от тяжести заболевания.

Спирохэтоз: (0,5% раствор), используемый для профилактических целей и контроля.

• **Голуби:** 0,015-0,025 г / кг массы тела 4 раза в день.

(15-25 мг активного вещества / кг массы тела / 4 раза в день).

▪ **Программа профилактики:**

Использовать 100 г (активного вещества) на 200 литров воды следующим образом:

- **Бройлеры:** возраст 1-я неделя в течение 3 дней.
возраст 4-е недели в течение 1 дня.
- **Цыплята:** возраст 1-я неделя в течение 3 дней.
возраст 4-е недели в течение 1 дня.
9-я и 20-я недели в течение 2 дней.
- **Куры:** возраст 1-я неделя в течение 5 дней.
4, 9, 16, 20 и 24-я недели в течение 2 дней.
- **Индейки:** возраст 1-я неделя в течение 5 дней.
возраст 3-и недели на 1 день.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА: Для потребления мяса: 7 дней.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Во время лечения яйца не использовать для потребления человеком.
- Не использовать для куриц, несущих яйца.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30 ° C.

УПАКОВКА: 113 г и другие.