

TYLOSIN-50%

ТИЛОЗИН – 50%

Водорастворимый порошок
Для домашней птицы, индейки, голуби

VARCO
АНТИБИОТИКИ

СОСТАВ: Каждый грамм содержит:

Тилозин (Тилозин Тартрат)

500 мг

СВОЙСТВА:

Тилозин в качестве сильного макролидного антибиотика охватывает широкий спектр грам-положительных бактерий, таких как: Стафилококк, Стрептококк, Корине, Диплококк, Клостридии и другие бактериальные инфекции, вторичные по отношению к вирусным заболеваниям.

- Очень эффективен против микоплазмозов и влияет также на некоторые виды риккетсии (групповой пситтакоз-хламидиоз) и гемофилов.
- Некоторые грам-отрицательных бактерий (*Pasteurella*, *Campylobacter*) также чувствительны к тилозину.

ПОКАЗАНИЯ:

- Для профилактики и лечения: Микоплазмоз, хронические респираторные инфекции, воздушный суккулит, инфекционный синовит, инфекционный синусит, Хламидиоз, Спирохэтоз.
- Условия стресса, вызванные вакцинацией, дебакированием, транспортировкой, повторным посещением, изменениями корма и погодой.

ДОЗИРОВКА:

- **Подготовка раствора:** добавьте 2 литра воды к Тилозин 50% (**соблюдать последовательность!**) и хорошо растворить, затем добавить в резервуар для воды.
- **Лечение:**
 - Респираторные или общие инфекции у домашней птицы: (0,05% раствор) 200 г тилозина 50% на 200 литров воды в течение 3-5 дней в зависимости от тяжести заболевания.
 - Спирохэтоз: (0,5% раствор), использовать для профилактики и контроля.
 - **Голуби:** 0,03-0,05 г / кг массы тела 4 раза в день
(15-25 мг активного вещества/ кг массы тела / 4 раза в день).
- **Программа профилактики:**

Использовать 200 г на 200 литров воды следующим образом:

 - **Бройлеры:** возраст 1-я неделя в течение 3 дней.

возраст 4-е недели в течение 1 дня.

- **Цыплята:** возраст 1-я неделя в течение 3 дней.

возраст 4-е недели в течение 1 дня.

9-я и 20-я недели в течение 2 дней.

- **Куры:** возраст 1-я неделя в течение 5 дней.

4, 9, 16, 20 и 24-я недели в течение 2 дней.

- **Индейки:** возраст 1-я неделя в течение 5 дней.

возраст 3-и недели на 1 день.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА: Для потребления мяса: 7 дней.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Во время лечения яйца не использовать для потребления человеком.
- Не использовать для куриц, несущих яйца.
-

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30 ° C.

УПАКОВКА: 113 г и другие.