

TYLOVAR ТИЛОВАП

Раствор для инъекций

Для овец, коз, крупного рогатого скота, свиней,
собак, кошек, домашней птицы

VARCO

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Бактерицидные / АНТИБИОТИКИ

СОСТАВ: Каждый мл содержит:

Тилозин (в виде Тилозин тартрата)

200 мг

СВОЙСТВА:

Макролидный антибиотик, который в основном активен против грам-положительных и некоторых грам-отрицательных бактерий, крупных вирусов, некоторых спирохет и микоплазм.

ПОКАЗАНИЯ: Для лечения следующих заболеваний:

- Инфекции респираторных и урогенитальных путей, конъюнктивит, тонзиллит, внешний вид отита, метрит, артрит, ринит.
- Микоплазмы, дифтерия телят, вибрионы, гниение стопы, листерия, заразная агалактия, лихорадка, лептоспира, рожа.
- Энтерит, дизентерия, артрит.
- Инфекции хламидий, клостридий, стафилококков, стрептококков и т.д.
- Раны, пиодерматиты и вторичные инфекции во время вирусных заболеваний.
- Мастит (поддерживающее лечение).
- Птица: насморк, хронические респираторные инфекции, синусит, спирохеты, пастура, синовит, воздушный суккулит.

ДОЗИРОВКА: Ежедневно путем внутримышечной инъекции в течение 3-5 дней.

Овцы, козы, собаки, кошки: 0,5-1,0 мл / 10 кг массы тела.

Крупный рогатый скот: 2-5 мл / 100 кг массы тела.

Телята, свиньи: 0,5-2,5 мл / 50 кг массы тела.

Птица: Подкожная инъекция: 0,05-0,1 мл / кг массы тела.

Индейки (синусит): вводят в синусы (0,12-0,25 мл). Повторять через 10 дней при необходимости.

Пожалуйста, внимательно прочитайте примечания перед использованием:

- Вводить только (10) мл внутримышечно.
- Может вызывать боль в месте инъекции.

- В месте инъекции может возникать непрерывное локализованное набухание
- Не использовать яйца несушек в еду.
- Во время лечения яйца не использовать для потребления человеком.

ВРЕМЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА:

- Мясо птицы и яйца: 5 дней.
- Молоко: 4 дня.
- Свиное мясо: 14 дней.
- Другое мясо: 21 день.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30 ° С.

УПАКОВКА: (50, 100) мл.