

# تتراميزول - 10

بودرة قابلة للذوبان في الماء

طارق الديدان المأمون الاستعمال والواسع الفعالية ضد الديدان الاسطوانية ويرقاتها في الحيوانات المختلفة

التركيب: كل غم يحتوي على:

تتراميزول هيدروكلورايد 100 ملغم

## الخواص:

- التتراميزول: طارق الديدان الواسع الطيف وشديد الفعالية (مجموعة اميدوثيازول) ضد الديدان الاسطوانية (المستديرة / النيماتود) في الجهاز الهضمي، وضد الديدان الرئوية في المجترات.
- علاج مأمون الاستعمال ضمن الجرعات المقررة، حتى للحيوانات الحوامل.
- يعمل على اثارة العقد العصبية للديدان والتي تؤدي الى تقلصات مستمرة للالياف العضلية فيها مما يسبب شللها وموتها.

## الإستطبابات:

- معالجة و مكافحة اصابات الانواع المختلفة من الديدان الاسطوانية (المستديرة / النيماتود) التي تصيب الجهازين الهضمي والتنفسي في المجترات والارانب والدواجن:
  - المجترات والارانب:
  - ديدان الجهاز الهضمي: الاسكاريس، نيماتودايرس، هيمونكس، كوبريا، اوستريجييا، ترايكوريس، سترونجيلويدس.
  - الديدان الرئوية: ديكتيوكولاس.
- الدواجن:
  - اسكاريديا، هيتراكيس، كابيلاريا، اميدوستومم.

## الجرعات:

- يعطى العلاج مع ماء الشرب او بالعلف.
- تعطى جرعة واحدة في كل مرة.
- الضأن والماعز والابقار والجمال:
  - 1.5 غم / 10 كغم وزن جسم . ( 15 ملغم فعالية / كغم وزن جسم).
  - تكرار الجرعة كل 4-6 اشهر .
- الدواجن والحمام والارانب :
  - 0.18 غم / كغم وزن جسم, ( 20 ملغم فعالية / كغم وزن جسم).
  - تكرار المعالجة للدواجن والحمام كل ثلاثة اشهر ، وللارانب مرتين في السنة.

## فترة الامان:

- لاستهلاك اللحوم والبيض: اسبوع.
- لاستهلاك الحليب: يوم.

## تنبيهات:

- تجنب معالجة الحيوانات الهزيلة او المريضة.
- يجب عدم استعمال المبيدات العضوية الفسفورية للحيوانات خلال (14) يوماً من المعالجة بالنتراميزول.
- قد يحدث احياناً في بعض الحيوانات، اسهال خفيف وسعال وزيادة في سيلان اللعاب.

**التخزين:** يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 ° م .

**العبوات:** (100، 250، 500، 1000) غم.