

توكوفيت - س

محلول للحقن

التركيب: كل مل يحتوي على :

80 ملغم

فيتامين هـ أسيتيت

1.6 ملغم

سيلينايت الصوديوم

الخواص:

- **فيتامين هـ :**
 - ضروري للوظيفة الطبيعية لعضلة القلب.
 - مضاد للتأكسد بعمليات الإستقلاب (الأبيض) في الخلايا.
 - يعمل على تقوية المناعة مما يؤدي إلى زيادة مقاومة الجسم ضد الأمراض.
- **السيلينيوم:** ضروري للنمو والخصوبة.
- **التركيبة المشتركة للسيلينيوم وفيتامين هـ (هـ / س):** يعملان ويؤثران بشكل تآزري على حماية إستقلاب (الأبيض) الخلايا من الأوكسدة المتلفة، للحفاظ على سلامتها، وللتخفيف من أعراض نقص مادتي (هـ / س) في الجسم.

الاستطبابات:

- للوقاية ومعالجة متلازمة نقص مادتي (هـ / س):
- اعتلال وضعف العضلات الهيكلية والقلبية في الحملان والسخول والعجول:
 - التيبس العضلي للحملان والسخول (مرض العضلات البيضاء).
 - التيبس العضلي للعجول (مرض الضعف العضلي).
- **الخنزير:**
 - مرض القلب التوتي والذي ينتج عن الإعتلال الشديد لعضلة القلب.
 - تليف الكبد الغذائي.
- ضعف النمو والحيوية ومناعة الجسم.
- يعطى أثناء فترة الحمل لحماية المواليد الجدد من ظهور أعراض نقص مادتي (هـ / س).
- معالجة اضطرابات الجهاز التناسلي في الذكور والإناث:
 - ضعف الخصوبة وتكيس المبايض والإجهاض المتكرر ونفوق الأجنة وإنجاب المشيمة.
 - قلة المنى وضعف عملية التقيح.
- حالات تليف الدماغ (التهاب الأنسجة المخية) والتهاب المفاصل والنخر الكبدي.

الجرعات: يعطى حقناً بالعضل أو تحت الجلد.

- **الحملان والسخول:**
 - **المواليد الجدد:** 0.5 مل للحيوان الواحد.
 - **المواليد الأكبر عمراً:** 0.5-1 مل للحيوان الواحد.
- **العجول:** 1-2 مل لكل 45 كغم وزن جسم.
- **الخننازير:** 1 مل لكل 25 كغم وزن جسم.
- يمكن تكرار الجرعات السابقة بعد (2-4) أسابيع عند الضرورة.
- **مرحلة الحمل (قبل الولادة):** لحماية المواليد الجدد (الحملان والسخول والعجول) من ظهور أعراض نقص مادتي (هـ / س) عليها:
 - **النعاج والماعز** (بعد 3 شهور من الحمل): 2 مل لكل 50 كغم وزن جسم.
 - **الأبقار** (بعد 5 شهور من الحمل): 2 مل لكل 50 كغم وزن جسم.
- عند الضرورة، يمكن تكرار الجرعات (**للنعاج والماعز والأبقار**) لعدة مرات لا تزيد عن أربعة، وعلى أن يفصل بينها فترة اسبوعين على الأقل.

فترة الأمان:

- **لاستهلاك اللحوم:** أسبوعان.
- **لاستهلاك الحليب:** خمسة أيام.

تنبيهات:

- يجب عدم تجاوز الجرعات المقررة.
- لا يستعمل للأبقار في فترة انتاج الحليب.
- احتمال حدوث تفاعلات تحسسية أحياناً، وفي هذه الحالة يعطى (الابنفرين) في الحال.

التخزين:

- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 °م.

العبوات: (50، 100) مل.