

# تايلوزين - 100 %

بودرة قابلة للذوبان في الماء  
للدجاج والحش (الرومي) والحمام

التركيب: كل 113 غم تحتوي:

## تايلوزين (تايلوزين تارتريت) 100 غم

### الخواص:

- يعتبر التايلوزين من الصادات الحيوية (مجموعة الماكرولايد) ذو الفعالية الواسعة الطيف والقوية ضد البكتيريا ذات صبغة جرام الايجابية: المكورات العنقودية والعقدية والكوبراين والكلوستريديا والبكتيريا الثانوية المصاحبة للأمراض الفيروسية.
- التايلوزين فعال جدا ضد إصابات المايكوبلازما كما أن له تأثيراً على بعض أنواع الركتسيا (مجموعة بستاكوزيس-كلاميديوزيس) وكذلك الهيموفيلوس جاليسينكوم.
- هناك بعض أنواع من البكتيريا ذات صبغة جرام السلبية (الباستريلا، كاميلو باكتر) تتأثر أيضاً بمفعول التايلوزين.

### الإستطبابات:

- للوقاية والمعالجة من إصابات المايكوبلازما والرشح المزمن والتهاب الاكياس الهوائية والتهاب الأغشية الزلالية للمفاصل والتهاب التجاويف الانفية والكلاميديا وزهري الطيور (سبيروكيثا).
- حالات الإجهاد الناتجة عن اللقاحات وقص المناقير والنقل وتغيير بيوت الدواجن والعلف واختلاف الأحوال الجوية.

### الجرعات:

- تحضير المحلول: يضاف 4 لترات ماء إلى تايلوزين 100% (ولا يعكس) وتذاب جيداً ، ثم يضاف المحلول إلى كمية الماء المقررة.
- المعالجة:
- أمراض الجهاز التنفسي والحالات الأخرى في الدواجن: (محلول 0.05%) 100 غم فعالية لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3-5 أيام وذلك حسب شدة الإصابة.
- زهري الطيور: محلول 0.5% يعطى للعلاج والوقاية من هذا المرض.
- طيور الحمام: يعطى 15-25 ملغم فعالية لكل كغم وزن جسم / 4 مرات يومياً مع ماء الشرب.
- : 0.015 - 0.025 غم / كغم وزن جسم ، اربع مرات يومياً مع الماء.
- برنامج الوقاية: يعطى 100 غم فعالية لكل 200 لتر من ماء الشرب وذلك حسب البرنامج التالي:-
- دجاج اللحم:
- يعطى في الاسبوع الأول من العمر لمدة ثلاثة أيام.
- يعطى في الاسبوع الرابع من العمر لمدة يوم واحد.
- فراخ البياض:
- يعطى في الاسبوع الأول من العمر لمدة ثلاثة أيام.
- يعطى في الاسبوع الرابع من العمر لمدة يوم واحد.
- يعطى في كل من الاسبوع التاسع والاسبوع العشرين من العمر لمدة يومين.

## • قطعان الامات:

- يعطى في الاسبوع الأول من العمر لمدة خمسة أيام.
- يعطى لمدة يومين في كل من اسابيع العمر التالية :-
- الرابع والتاسع والسادس عشر والعشرين والرابع والعشرين .

## • طيور الحبش (الرومي) :

- يعطى في الاسبوع الأول من العمر لمدة خمسة أيام.
- يعطى في الاسبوع الثالث من العمر لمدة يوم واحد.

فترة الأمان: \* لاستهلاك اللحوم: أسبوع.

## تنبيه:

- لا ينصح باستعماله لدجاج بيض المائدة.
- أثناء المعالجة ، يجب عدم استعمال البيض للاستهلاك البشري.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات: ( 113 غم ) وأوزان أخرى.