

تايلوفاب

محلول للحقن

للضأن والماعز والابقار والخنازير والكلاب والقطط والدواجن

التركيب: كل مل يحتوي على:

تايلوزين (تارتريت) 200 ملغم

الخواص:

- صاد حيوي (مجموعة الماكرولايد) ذو الفعالية الواسعة الطيف ضد البكتيريا ذات صبغة جرام الايجابية والسلبية والفيروسات الكبيرة والمايكوبلازما وبعض انواع السبيروكيتا.

الاستطبابات: معالجة الحالات التالية:

- إصابات الأجهزة التنفسية والبولية التناسلية، التهاب ملتحمة العين واللوزتين والتهاب الاذن الخارجية والتهاب الرحم والرشح.
- المايكوبلازما ودفنيريا العجول وتعفن الظلف والأجالاتيا واللبتوسبيرا والفيريرو وحمى الشحن (الباستريلا) والليستيريا والاريسيلاس.
- النزلات المعوية والزحار (الدوزنتاريا) والتهاب المفاصل.
- إصابات الكلاميديا والكلوستريديا والمكورات العنقودية والعقدية.
- المعالجة الداعمة لالتهاب الضرع.
- الجروح وتقح الجلد، والإصابات الثانوية المصاحبة للأمراض الفيروسية.
- الدواجن: الرشح المزمن والتهاب التجاويف الانفية وزهري الطيور (سبيروكيتا) والباستريلا والتهاب الاكياس الهوائية والتهاب الاغشية الزلالية للمفاصل.

الجرعات: يعطى حقناً بالعضل يومياً لمدة 3-5 أيام.

- الضأن والماعز والكلاب والقطط: 0.5-1 مل / 10 كغم وزن جسم.
- الأبقار: 2-5 مل / 100 كغم وزن جسم.
- العجول والخنازير: 0.5-2.5 مل / 50 كغم وزن جسم.
- الدواجن: (حقن تحت الجلد): 0.05-0.1 مل / كغم وزن جسم.
- دجاج الحبش (الرومي): حقن مباشر في التجاويف الأنفية: 0.12-0.25 مل. وتعاد الجرعة بعد (10) أيام عند الضرورة.

تنبيهات:

- لا يحقن أكثر من (10) مل بالعضل في الموضع الواحد.
- لا يستخدم للدجاج البياض.
- لا يستخدم البيض للاستهلاك البشري خلال فترة المعالجة.

فترة الأمان:

- لاستهلاك لحوم الدواجن والبيض: 5 أيام.
- لاستهلاك الحليب: 4 أيام.
- لاستهلاك لحم الخنزير: 14 يوماً.
- لاستهلاك اللحوم الأخرى: 21 يوماً.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات: (50، 100) مل.