

# VACOMIL-35%

# ВАКОМИЛ-35%

## ФУНГИЦИД

Класс:  
Acylalanine

### СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК

**Системный фунгицид, эффективен в борьбе с грибковыми заболеваниями: плесень, ложная мучнистая роса и почвенные болезни.**

**СОСТАВ:** Каждый кг содержит:

**МЕТАЛАКСИЛ** 35% вес / вес (активного вещества)

#### СВОЙСТВА:

**ВАКОМИЛ 35%:** системный фунгицид, эффективный для борьбы с грибковыми заболеваниями на самых разных культурах.

**ВАКОМИЛ 35%:** используется на многих культурах, таких как: картофель, тыква, лук, чеснок, виноград, клубника, фруктовые деревья, оливки, декоративные растения.

**ВАКОМИЛ 35%:** Используется в качестве обработки семян для защиты от заболеваний почвы.

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ЗАБОЛЕВАНИЕ	НОРМА РАСХОДА гм/ 20 л ВОДЫ	БЕЗОПАСН ЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
<b>Картофель, помидоры, огурец, тыква, кабачек, арбуз.</b>	Ложная мучнистая роса, фитофтороз	15	7
<b>Лук, чеснок.</b>	Ложная мучнистая роса, гниль, плесень	6 - 12	7
<b>Клубника</b>	Пятнистость листьев, корневая гниль, гниль стеблей	15	15
<b>Виноград</b>	Ложная мучнистая роса	15 - 20	7

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.

<b>Абрикос, слива, вишня, персик, миндаль, яблоко, груша.</b>	Пятнистость листьев, курчавость листьев, парша	20	15
<b>Оливки</b>	Листовая пятнистость	8-10	15
<b>Декоративн ые растения</b>	Ложная мучнистая роса	8-10	-----

#### **ВНИМАНИЕ:**

- Использовать только на вышеупомянутых культурах и соблюдать рекомендованный безопасный период перед уборкой урожая.
- Использовать в качестве протравливания семян для борьбы с появляющимися заболеваниями, норма расхода 200 г продукта / 100 кг семян.

#### **ЛЕЧЕНИЕ ЖИДКОЙ СМЕСЬЮ:**

Тщательно перемешать соответствующее количество **ВАКОМИЛ 35%** с соответствующим количеством семян и достаточным количеством воды для получения жидкой смеси (в течение 3-5 минут).

#### **СУХАЯ ОБРАБОТКА:**

Использовать механический смеситель: 0,5-1 л воды / 100 кг семян, размешивать в течение 1-2 минут, затем добавить соответствующую дозу **ВАКОМИЛ 35%** и снова размешивать в течение 3 минут.

#### **ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:**

Через 48 часов после последнего применения.

#### **СОВМЕСТИМОСТЬ:**

Совместим с большинством пестицидов, в состав которых входят щелочные соединения.

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.