

# VАСОМІL-5%

# ВАКОМІL-5%

## ФУНГИЦИД / ГРАНУЛЫ

Класс:  
Ацилаланины

**Системный фунгицид эффективен в борьбе с почвенными болезнями.**

**СОСТАВ:** Каждый кг содержит:

**МЕТАЛАКСИЛ**

**5% вес / вес  
(активного вещества)**

### СВОЙСТВА:

**ВАКОМІL-5%:** Превентивный и лечебный фунгицид с длительным действием.

**ВАКОМІL-5%:** основан на металаксиле, который является системным фунгицидом для защиты растений в стадии роста.

**ВАКОМІL-5%:** Используется для обработки почвы от почвенных грибковых заболеваний: корневая гниль и гниль стеблей, поражающая яблони, груши, персик, абрикосы, сливы, цитрусовые, оливки, перец, баклажан, табак, морковь, клубнику и дерн.

**ВАКОМІL-5%:** безопасен и не вызывает снижения роста растений.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

**ВАКОМІL-5%** готов к применению. Поступает в корневую зону либо с ливнем, либо путем орошения. Древесные культуры: перед нанесением **ВАКОМІL-5%** на почву сорняки под пологом дерева следует удалить. Гранулы равномерно распределяются по всей поверхности почвы под пологом деревьев.

КУЛЬТУРА	ЗАБОЛЕВАНИЕ	НОРМА РАСХОДА	ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ
Яблоня, груша, персик, абрикос, сливы, цитрусовые, оливки.	Гниль ветвей, корней и побегов, бурая гниль (Гоммоз).	25 – 50 г/м <sup>2</sup>	1-е применение до начала дождливого периода. 2-е применение спустя 12-20 недель, дальнейшие обработки следует проводить только через два года

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.

<b>Авокадо</b>	Корневая гниль, Ризоктониоз	25 – 50 г/м <sup>2</sup>	1-е применение до начала дождливого периода. 2-е применение спустя 12-20 недель, дальнейшие обработки следует проводить только через два года
<b>Клубника</b>	Покраснение осевого цилиндра (сердцевина), гниль корневища.	1-2 кг / донум. Или 100-200 г / 100 м на ряд .	Наносить полосой 20 см на поверхность почвы; следить за ирригацией. Первое применение непосредственно перед посадкой.
<b>Орех Макадамия</b>	Гниль корней, некроз ствола	25 – 50 г/м <sup>2</sup>	Вносить в почву в начале летнего влажного сезона и повторять с интервалом от 3 до 6 месяцев.
<b>Перец, баклажан.</b>	Корневая и стеблевая гнили.	4 кг / Донум	Фунгицид наносить в виде полосы шириной 30-40 см: 1-е применение проводить через 10-20 дней после посадки. 2-е применение через 5-6 недель.
<b>Картофель</b>	Розовая гниль	2 кг / Донум	Гранулы следует наносить во время посева, непосредственно в посевные борозды (узкополосная обработка).
<b>Помидоры</b>	Выпревание	2 - 4 кг / Донум	<b>Перед пересадкой:</b> наносить полосу шириной 30 см вдоль рядов и вносить в почву на глубину от 5 до 10 см. Повторять через 21 день.
<b>Тыква, стручковый перец, капуста, цветная капуста, брокколи, брюссельская капуста</b>	Выпревание	4 кг / Донум	<b>Перед пересадкой:</b> наносить полосу шириной 30 см вдоль рядов и включать в почву.
<b>Морковь</b>	Плотная пятнистость (Pythium complex).	2.5 кг / Донум	Через 4-6 недель после посева.

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.

<b>Тобак</b>	Черная ножка	4 кг / Донум	Предпочтительно использовать перед пересадкой с последующим включением в почву ( в гребни).
<b>Спаржа</b>	Гниль корней	1.0 –1.25 кг / Донум	Применять ежегодно ранней весной за 1-2 недели до появления побегов либо в виде полосы 50 см на ряд, либо наносить на почву под пологом дерева. Убедитесь, что в почве нет сорняков и мусора.
<b>Газон</b>	Гниль, выпревание, желтый газон, ложная мучнистая роса.	1.5-3.5 кг / Донум	Повторное лечение проводить через 10-21 дней в периоды, благоприятные для развития болезни; максимум 3 применения за сезон.

Донум = 1000 м<sup>2</sup>.

**ВНИМАНИЕ:**

Используется только на вышеупомянутых культурах.

**СРОК АКТИВНОСТИ:**

При нормальных условиях 12-20 недель. Активный ингредиент легко выделяется в почву после дождя или орошения. Существует минимальная потеря активного ингредиента из-за испарения, когда продукт находится в контакте с почвой.

**СОВМЕСТИМОСТЬ:**

Совместим с большинством пестицидов, кроме щелочных соединений.

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.