

# VACOMIL-MZ 72%

# ВАКОМИЛ-МЗ 72%

Класс:  
Dithiocarbamate<sup>(1)</sup>  
Acylalanine<sup>(2)</sup>

## ФУНГИЦИД

### СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК

Эффективный фунгицид с системным и контактным действием для борьбы с широким спектром грибковых заболеваний, таких как гниль и ложная мучнистая роса на разных сельскохозяйственных культурах.

**СОСТАВ:** Каждый кг содержит:

**МАНКОЦЕБ** <sup>(1)</sup>

**64% вес / вес (активного вещества)**

**МЕТАЛАКСИЛ** <sup>(2)</sup>

**8% вес / вес (активного вещества)**

#### СВОЙСТВА:

**ВАКОМИЛ-МЗ 72%:** защищает растение на стадии роста, Металлаксил проникает через ткань растения, в то время как Манкозепб защищает вне ткани.

**ВАКОМИЛ-МЗ 72%:** Контролируйте широкий спектр грибковых заболеваний на разных сельскохозяйственных культурах.

**ВАКОМИЛ-МЗ 72%:** оказывает немедленное воздействие на плесень и ложную мучнистую росу на винограде, помидорах, картофеле, луке и других культурах, упомянутых ниже в таблице, ранняя плесень и фитофтороз на томате, картофеле и листовая пятнистость.

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	НОРМА РАСХОДА гм/ 20 л ВОДЫ	ВРЕМЯ МЕЖДУ ПРИМЕНЕН ИЕМ	ВНИМАНИЕ	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Помидоры (открытый грунт)	70	7 дней	Обрабатывать 3 раза в течение периода роста: первое применение проводить при появлении первых симптомов и после в течение активного периода роста. Пока растение растет и зреет, использовать дополнительно еще один распространенный фунгицид через 7 дней после последнего применения <b>ВАКОМИЛ-МЗ 72%.</b>	7

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.

<b>Картофель</b>	50	7 дней	3 раза в течение активного периода роста, еще один фунгицид можно использовать через 7 дней после последнего применения <b>ВАКОМИЛ-МЗ 72%</b> .	14
<b>Лук</b>	50	7 дней	Обработку проводить 3 раза максимум, первое применение - до появления первых симптомов заболевания.	10
<b>Дыня, кабачок</b>	50	14 дней	---	4
<b>Салат</b>	50	14 дней	---	7
<b>Перец</b>	50 – 60	21 день	---	7
<b>Виноград</b>	50	10 дней	Обрабатывать максимум четыре раза: 1. Когда высота растения составляет 20-25 см. 2. До стадии цветения через 14 дней после первого применения. 3. В конце периода цветения. 4. Через 14 дней на стадии цветения предпочтительно использовать другие обычные фунгициды (через 7 дней после последнего применения <b>ВАКОМИЛ-МЗ 72%</b> ).	14
<b>Фруктовые деревья</b>	140	Первое применение весной, а второе - осенью после сбора урожая	Ширина борозды составляет около 90 см <sup>2</sup>	7
<b>Цитрусовые деревья</b>	60 – 120	3 месяца	---	21

#### **ВНИМАНИЕ:**

Использовать только на выше упомянутых культурах и соблюдать рекомендованный безопасный период перед уборкой урожая.

#### **ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:**

Через 48 часов после последнего применения.

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.

**СОВМЕСТИМОСТЬ:**

Совместим с большинством известных фунгицидов и инсектицидов.

**\* ДРУГАЯ ФОРМА И ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ:**

**VACOMIL-FORTE 58% WP (MANCOZEB 48% + METALAXYL 10%),  
PANALAXIL – 72% WP.**

- **Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.**