VAPCOCORTIN-FORTE ВАПКОКОРТИН-ФОРТЕ

Раствор для инъекций

Для животноводства

СОСТАВ: Каждый мл содержит:

VAPCO

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ

2 мг

Дексаметазон натрия фосфат

СВОЙСТВА:

- Высокоэффективный глюкокортикоид.
- Имеет противовоспалительное терапевтическое действие.
- Обладает активностью в отношении углеводного и белкового метаболизма (глюконеогенез).

показания:

- Различные воспалительные, ревматические и аллергические случаи.
- Шоковые состояния.
- Миозит, остеоартрит, бурсит, растяжения, тендинит, карпит, тендовагинит.
- Экзема, Крапивница, Пруритовый дерматит..
- Кетоз (ацетонемия), токсикоз при беременности.
- Поддерживающая терапия в случаях молочной лихорадки, Мастит, Метрит, агалактия, случаи лихорадки (Psteurellosis), нераспределенная плаценты, насекомые, укусы змей и стрессовые условия (усталость, тепловой удар и т.д. ...).
- Аллергические заболевания желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей, Пиелонефрит.

ДОЗИРОВКА: вводить путем внутримышечной или медленно внутривенной инъекции.

- Крупный рогатый скот, верблюды, лошади: 5-10 мл на одно животное.
- Телята, жеребята, овцы, козы, свиньи: 1-3 мл на одно животное.
- Ягнята, козлята, собаки, кошки, поросята: 0,1-1 мл на одно животное.

При необходимости повторить инъекцию.

Внимательно прочитайте приведенное замечание пред использованием:

- Не назначается при поздней беременности.
- Не назначается в сочетании с другой вакциной.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ: Временное снижение выхода молока.

СРОК ПЕРЕХОДА:

- Для потребления мяса: 3 недели.
- Для потребления молока: 3 дня.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре ниже 30 ° C.

УПАКОВКА: (50, 100) мл.