

VARCOGENT-10% **ВАПКОГЕНТ-10%**

Раствор для инъекций

VARCO

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Бактерицидные / АНТИБИОТИКИ

СОСТАВ: Каждый мл содержит:

Гентамицин (в виде Гентамицин сульфата)

100 мг

СВОЙСТВА:

- Гентамицин представляет собой широкодиапазонный аминогликозидный антибиотик, который обладает высокой эффективностью против многих штаммов грам-положительных и грам-отрицательных бактерий: *e coli*, сальмонеллы, пастура, вибрионов, стафилококки, стрептококки, листерии, рожистые инфекции, псевдомонады, клебсиеллы, шигеллы, протеи, коринебактерии, энтеробактер сerratия, трепонема, алькалигenez, кампилобактер, актинобациллы, параколон, микоплазм.
- Быстро распространяется в организме и сохраняется в крови и тканях в течение 12-24 часов, кроме того, он устраняется без изменений через почки, что приводит к высокой концентрации в мочевых каналах.

ПОКАЗАНИЯ:

- Для жвачных животных, лошадей, собак, кошек, свиней, домашней птицы.
- Инфекции дыхательных путей: бронхит, пневмония, тонзиллит, трахеиты и т.д.
- Инфекции желудочно-кишечного тракта: гастрит, перитонит, энтерит, понос, кровавая диарея, вибрационная дизентерия и т.д.
- Инфекции мочевых путей: нефрит, пиелит, пиелонефрит, уретрит, цистит и т.д.
- Инфекции половых путей: метрит, цервицит и мастит (поддерживающее лечение)
- Сепсис, артрит, инфекции кожи и ран.
- Предотвращение ранней смертности новорожденных, очень молодых животных и недавно вылупившихся птенцов.

ДОЗИРОВКА:

• путем внутримышечной инъекции:

- жвачные животные, лошади: 1-2 мл / 50 кг массы тела
- собаки, кошки, свиньи: 0,5 мл / 10 кг массы тела
- доза в первый день – разделить на два раза; затем давать один раз в день не более 7 дней подряд.

• **путем подкожного введения (в область шеи):**

- однодневные цыплята: разбавляют стерильной водой (дистиллированной водой или физиологическим раствором) 1: 100, а затем вводят 0,2 мл / цыпленка
- 1-3 дня индейки: разбавляют стерильной (дистиллированной водой или физиологическим раствором) 1:20, а затем вводят полученный раствор 0,2 мл / цыпленка.

• **Перорально для домашней птицы:** 1 мл / литр питьевой воды в течение 4-5 дней.

ВРЕМЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА:

- Для потребления мяса: 45 дней.
- Для потребления молока: 3 дня.

Пожалуйста, внимательно прочитайте примечания перед использованием:

- Не использовать с общей анестезией, миорелаксантами, другими аминокликозидами или продуктами полимиксина.
- Не назначать при дисфункции почек.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ: В редких случаях у кошек может возникать нефротоксичность и ототоксичность.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30 ° С.

УПАКОВКА: (50, 100) мл.