

# VARCOGENT-5%

# ВАПКОГЕНТ-5%

Раствор для инъекций

Для жвачных животных, лошадей, собак, кошек,  
свиней, птицы

VARCO

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ  
Бактерицидные / АНТИБИОТИКИ

**СОСТАВ:** Каждый мл содержит:

Гентамицин (в виде Гентамицин сульфата)

50 мг

## СВОЙСТВА:

- Гентамицин представляет собой широкодиапазонный аминогликозидный антибиотик, который обладает высокой эффективностью против многих штаммов грам-положительных и грам-отрицательных бактерий: *e coli*, сальмонеллы, пастура, вибрионов, стафилококки, стрептококки, листерии, рожистые инфекции, псевдомонады, клебсиеллы, шигеллы, протеи, коринебактерии, энтеробактер сerratia, трепонема, алькалигенез, кампилобактер, актинобациллы, параколон, микоплазм.
- Быстро распространяется в организме и сохраняется в крови и тканях в течение 12-24 часов, кроме того, он устраняется без изменений через почки, что приводит к высокой концентрации в мочевых каналах.

## ПОКАЗАНИЯ:

- Для жвачных животных, лошадей, собак, кошек, свиней, домашней птицы.
- Инфекции дыхательных путей: бронхит, пневмония, тонзиллит, трахеиты и т.д.
- Инфекции желудочно-кишечного тракта: гастрит, перитонит, энтерит, понос, кровавая диарея, вибрационная дизентерия и т.д.
- Инфекции мочевых путей: нефрит, пиелит, пиелонефрит, уретрит, цистит и т.д.
- Инфекции половых путей: метрит, цервицит и мастит (поддерживающее лечение)
- Сепсис, артрит, инфекции кожи и ран.
- Предотвращение ранней смертности новорожденных, очень молодых животных и недавно вылупившихся птенцов.

## ДОЗИРОВКА:

- **При внутримышечной инъекции:**
  - Жвачные, лошади: 2-4 мл / 50 кг массы тела
  - Собаки, кошки, свиньи: 1 мл / 10 кг массы тела

- доза в первый день – разделить на два раза; затем давать один раз в день не более 7 дней подряд.

• **Подкожная инъекция ( в область шеи):**

- однодневные цыплята: разбавляют стерильной водой (дистиллированной водой или физиологическим раствором) 1: 100, а затем вводят 0,4 мл / цыпленка
- 1-3 дневные индейки: разбавляют стерильной (дистиллированной водой или физиологическим раствором) 1:20, а затем вводят полученный раствор 0,4 мл / цыпленка.

• **Перорально для домашней птицы:** 2 мл / литр питьевой воды в течение 4-5 дней.

**ВРЕМЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА:**

- Для потребления мяса: 45 дней.
- Для потребления молока: 3 дня.

**Пожалуйста, внимательно прочитайте примечания перед использованием:**

- Не использовать с общей анестезией, миорелаксантами, другими аминогликозидами или продуктами полимиксина.
- Не назначать при дисфункции почек.

**ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:** В редких случаях у кошек может возникать нефротоксичность и ототоксичность.

**ХРАНЕНИЕ:** Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30 ° С.

**УПАКОВКА:** (50, 100) мл.