

# ВАРСОТНИОН ВАПКОТИОН

Класс:

Хлорированные углеводороды <sup>(1)</sup>  
Производные дифенила <sup>(2)</sup>

## АКАРИЦИД КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ

Эффективный акарицид широкого спектра действия, который убивает клещей на всех стадиях развития (яйца, личинки, нимфы и взрослые особи).

**СОСТАВ:** каждый литр содержит:

**ДИКОФОЛ** <sup>(1)</sup>

**21,25% вес / объем**  
**(активного вещества)**

**ТЕТРАДИФОН** <sup>(2)</sup>

**8% вес / объем**  
**(активного вещества)**

### СВОЙСТВА:

**ВАПКОТИОН:** Акарицид широкого спектра действия, который уничтожает все стадии развития клещей (яйцо, личинки, нимфа и взрослые особи) в томатах, арбузах, дынях, винограде и декоративных растениях.

**ВАПКОТИОН:** Обладает длительным остаточным действием и устойчив к естественному освещению и температуре.

**ВАПКОТИОН:** Не оказывает влияния на естественных врагов пауков.

**ВАПКОТИОН:** Обладает контактной активностью.

**ВАПКОТИОН:** Быстро проникает через ткани листьев; действует через листву.

**ВАПКОТИОН:** не токсичен для пчел.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

| КУЛЬТУРА                                      | НОРМА РАСХОДА<br>МЛ/ 20 Л ВОДЫ | БЕЗОПАСНЫЙ<br>ПЕРИОД (ДНИ) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Помидоры (теплица)                            | 40                             | 15                         |
| Виноград                                      | 40 - 50                        | 15                         |
| Декоративные<br>растения                      | 40                             | 15                         |
| Арбуза, мускусная<br>дыня (открытый<br>грунт) | 40 - 50                        | 15                         |

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.

**ВНИМАНИЕ:**

Используется только для выше упомянутых культур с соблюдением рекомендуемого безопасного периода до сбора урожая.

**ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Начинайте лечение, когда появляются первые признаки вредителя (при вылуплении яиц).

Распылять рано утром или вечером, при отсутствии ветра.

**ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:** 48 часов с момента последней обработки.

**СОВМЕСТИМОСТЬ:**

Совместим с большинством пестицидов, кроме *нитрата кальция*, *каптафола* и *серы*.

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.