

ВАРСОТОР-70% ВАПКОТОП-70%

Класс:
Тиофанаты

ФУНГИЦИД СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК

Системный фунгицид широкого спектра действия с защитным и лечебным действием, очень эффективен в борьбе с большим количеством грибковых заболеваний; легко поглощается листьями и корнями растений, используется в качестве защитного средства для обработки ран при обрезки деревьев.

СОСТАВ: Каждый кг содержит:

ТИОФАНАТ-МЕТИЛ

70% вес / вес (активного вещества)

СВОЙСТВА:

ВАКОТОП- 70%: системный фунгицид с защитным и лечебным действием, поглощаемый корнями и транслоцированный через сок.

ВАКОТОП- 70%: не подвержен воздействию дождя, остается активным в течение более длительного времени (длительная защита сельскохозяйственных культур).

ВАКОТОП- 70%: Контролирует распространение широкого спектра грибковых заболеваний на цитрусовых, яблоках, грушах, персиках, винограде, абрикосах, вишне, семечковых и косточковых фруктовых деревьях, клубнике, малине, манго, банане, папайе, фасоли, горохе, салате, картофеле, арбузе, мускусной дыне, огурцах, помидорах, баклажанах, бамии, перце, луке, кабачке, капусте, пшенице, ячмене, рисе, табаке, розах и гвоздике.

Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ЗАБОЛЕВАНИЕ	НОРМА РАСХОДА г/20 л ВОДА	ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Цитрусовые	Гниль основания плодов, Голубая плесень, Зеленая плесень. Парша, Серая гниль.	7 – 10 15 – 20	Первое опрыскивание; когда появляется заболевание.	1
Яблони, груши, персики	Мучнистая роса, парша, некроз, бурая гниль	10 – 20	Второе опрыскивание: Через 15 – 20 дней от последнего опрыскивания.	2
Виноград	Мучнистая роса, черная гниль, сгусток гнили	14 – 20		14
Абрикос	Парша.	15 – 20		21
Вишня	Бурая гниль, дырчатая пятнистость	15 – 20		14
Корень семечковых и косточковых фруктовых деревьев	Белая гниль корней (погрузить корень в течение 10 минут).	40		----
Клубника	Мучнистая роса, серая плесень, церкоспороз	6 - 12		14
Малина	Фузариозное увядание (погрузить корень на 1 час).	40 – 50		----
Манго	Антракноз	6 - 12		14
Банан	Сигатока	18 - 25		14
Папайя	Мучнистая роса	6 - 12		14
Бобы, горох, салат, картофель	Серая плесень, гниль стеблей, дырчатая пятнистость, белая гниль	15 – 20		7

Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.

КУЛЬТУРА	ЗАБОЛЕВАНИЕ	НОРМА РАСХОДА г/20 л ВОДЫ	ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Арбуз, мускусная дыня, огурцы, помидоры, баклажаны, бамия, перец, лук, кабачок	Мучнистая роса, серая гниль, парша, фитофтороз стеблей, антракноз, гниль стеблей и листьев, белая гниль, черная гниль, фузариозное увядание	10 – 15	Первое опрыскивание; когда появляется заболевание. Второе опрыскивание:	1
Капуста	Белая гниль	15 – 20	Через 15 – 20 дней от последнего опрыскивания.	3
Пшеница, ячмень	Мучнистая роса, гниль, фузариозное увядание	10 – 20		14
Рис	Пирикулярриоз, гниль основания, черная пятнистость	18 - 25		14
Табак	Белая стеблевая гниль, мучнистая роса, увядание, черная гниль	15 – 20 2-3 л/м ² (пересадка и вымачивание).		---
Розы и гвоздика	Мучнистая роса, серая плесень, гниль стволов	10 – 15		--

ВНИМАНИЕ:

Использовать только на вышеупомянутых культурах и соблюдать рекомендованный безопасный период перед уборкой урожая.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

Через 12 часов после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ: Совместим с большинством известных пестицидов, за исключением щелочных и медь содержащих соединений.

Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.