

# VARCOTRIM ВАПКОТРИМ

Раствор для инъекций

## VARCO

**ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ**  
**Бактерицидные / АНТИБИОТИКИ**

**СОСТАВ:** Каждый мл содержит:

<b>Триметоприм</b>	<b>40 мг</b>
<b>Сульфадiazин Натрия</b>	<b>200 мг</b>

### СВОЙСТВА:

- Действие препарата обусловлено сочетанием двух активных компонентов. Комбинация препаратов обладает бактерицидным действием против грам- положительных и грам- отрицательных микроорганизмов: стафилококков, стрептококков, актинобацилл, актиномицетов, E.coli, сальмонеллы, пастуры, пневмококков, коринебактерии, протеусов, кампилобактеров, клостридий, фузобактерий, вибрионов, клебсиелл, бордецеллов, гемофилий.
- Сульфонамиды блокируют превращение фолиевой кислоты в бактериальную клетку в биологически активную форму, и триметоприм увеличивает этот эффект за счет ингибирования конверсии дигидрофолат редуктазы фермента бактерий, которая необходима для превращения фолиевой кислоты в фолиевую кислоту, которая требуется для синтез ДНК, тогда как сульфонамид предотвращает образование фолиевой кислоты в бактериальной клетке путем ингибирования использования парааминобензойной кислоты, что приводит к прекращению бактериального размножения; такое синергетическое действие обоих ингредиентов на бактериальный метаболизм приведет к гибели бактерий.

### ПОКАЗАНИЯ:

- Для жвачных животных, лошадей, свиней, кошек, собак.
- Системное лечение широкого спектра бактериальных инфекций:
  - Инфекции дыхательных путей: ринит, бронхо-пневмония, трахеиты и т. д.
  - Инфекции пищевого тракта: слезоточивость, вибрационная дизентерия, перитонит, гастроэнтерит, диабетный колибактериоз, сальмонеллез, пастереллез, дизентерия ягненка (клостридии) и т. д.
  - инфекции мочеполового тракта: нефрит, пиелонефрит, пиелит, цистит, метрит, вагинит, цервицит, мастит (вспомогательное лечение), агалактия свиней и т. д.
  - Сепсис, гниение ног, пиодермия, раны, кожная инфекция.
  - Глаза, уши, инфекции рта.
  - Послеоперационное и послеродовое использование.
  - Бактериальные инфекции, вторичные по отношению к респираторным вирусным заболеваниям и микоплазму.

**ДОЗИРОВКА:**

- Жвачные животные, свиньи: 1 мл / 16 кг массы тела внутримышечно.
- Лошади: медленно внутривенно. только: 1 мл / 16 кг массы тела.
- Собаки, кошки: 1 мл / 8 кг массы тела подкожно.
- В тяжелых случаях повторять дозу ежедневно в течение 3-5 дней.

**ВРЕМЯ ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА:**

- Для потребления мяса: 10 дней (мясо овец: 18 дней).
- Для потребления молока: 3 дня.

**Пожалуйста, внимательно прочитайте примечания перед использованием:**

- Противопоказано при заболеваниях печени и почек.
- Обеспечить достаточное потребление воды во время лечения, чтобы уменьшить риск возникновения кристаллов.
- Флюмеквин не следует связывать с лечением Триметоприм Сульфонидами.

**ХРАНЕНИЕ:** Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30 ° С.

**УПАКОВКА:** (50, 100) мл.