

VAZURIL

ВАЗУРИЛ

Пероральный раствор

VARCO
противококцидиозные

СОСТАВ: Каждый мл содержит:

Толтразурил

25 мг

СВОЙСТВА:

- Широкий антикокцидиальный эффект против различных штаммов Eimeria.
- Во время внутриклеточной пролиферирующей фазы обоих шизонтов и гамет он ингибирует их деление ядра и приводит к гибели кокцидий.

ПОКАЗАНИЯ:

Лечение различных кокцидиозов:

- **Птица:** Eimeria spp. : Acervullina, Brunetti, Maxima, Mitis, Necatrix, Tenella, Hagani, Praesox.
- **Индюшки:** E. аденоиды, E. meleagrimitis.
- **Гуси:** E. anseris, E. truncata (кокцидии почек).

ДОЗИРОВКА:

- 200 мл на 200 литров питьевой воды (2) дня подряд. (7 мг активного вещества / кг массы тела)
- В тяжелых случаях повторять лечение после (5) дней в той же дозе (2) дня подряд.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА: Для потребления мяса: 7 дней.

ЗАМЕЧАНИЕ:

- Не замораживать.
- В случаях очень влажного и избыточного мусора на птицефабриках продолжать лечение еще на третий день.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Настоятельно рекомендуем использовать Неомицин или Колистин (600, 80) в течение 3-5 дней вместе с Вазурил для лечения вторичной инфекции кишечника, вызванной кокцидиозом.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30 ° C

УПАКОВКА: (100, 250, 500, 1000) мл.