

VERMECTIN-PLUS ВЕРМЕКТИН-ПЛЮС

Раствор для инъекций

Системный препарат против паразитов

Для овец, коз, крупного рогатого скота,
буйволов, верблюдов

VARCO

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
глистогонное средство

СОСТАВ: Каждый мл содержит:

Ивермектин	10 мг
Клорсалон	100 мг

СВОЙСТВА:

ИВЕРМЕКТИН, производное авермектина, является очень эффективным и безопасным лечением против внутренних и внешних паразитов у животных.

- действует, стимулируя высвобождения химических нейромедиаторов (габа-гамма-аминомасляной кислоты), прерывая нервные импульсы, которые парализуют паразита и убивают его.
- характеризуется быстрым распределением и продолжительным периодом выведения, обеспечивающим длительный паразитарный эффект.

КЛОРСАЛОН: Активен против взрослых и незрелых печеночных нематод и быстро абсорбируется в кровообращение, попадая под кожу и удаляется из-за ингибирования ферментов в гликолитическом пути, который является их основным источником энергии.

ПОКАЗАНИЯ: для лечения и контроля над следующим паразитарным заражением:

• ЭНДОПАРАЗИТЫ:

- Желудочно - кишечные нематоды (круглые черви): *Heamonchus*, *Chabertia*, *Ostertagia*, *Nematodirus*, *Trichuris*, *Cooperia*, *Bunostomum*, *Strongyloides*, *Oesophagostomum*, *Trichostrongylus*, *Toxocara*, *Parafilaria*, *Hyostrogylus*, *Ascaris suum*.
- Легочные черви: *Dictyocaulus*, *Protostrongylus*, *Metastrongylus*.
- Овальные носовые боты: (*Oestrus ovis*) личинки.
- Печеночный сосальщик: *Fasciola hepatica*.

• ЭКТОПАРАЗИТЫ:

- Миазы (личинки кожного овода у крупного рогатого скота): *Hypoderma bovis*, *H. Lineatum*
- Миазы (Тропические личинки у крупного рогатого скота): *Dermatobia hominis*.

- Миазы (вихревая муха): (паразитическая стадия) *Chrysoma bezziana*.
- Чесоточные клещи: *Sarcoptes*, *Psoroptes*, *Chorioptes*.
- Сосущие вши: *Linognathus*, *Haematopinus*, *Solenoptes*.
- Кусаящие вши: *Damalina*.
- Клещи.
- Глазные черви: *Thelazia*.

ДОЗИРОВКА: одноразовая терапия.

- Овцы, козы, крупный рогатый скот, буйволы, верблюды: 1 мл / 50 кг массы тела путем подкожной инъекции.
- Не вводите более 10 мл в одном месте инъекции. Дозу можно разделить.

СРОК ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА:

Для потребления мяса и молока: 28 дней.

Внимательно прочитайте примечания перед использованием:

- Может вызвать боль в месте инъекции.
- Не используется для кормящих животных или в течение 28 дней до родов.
- В месте инъекции может возникать локальная реакция.
- Лечение крупного рогатого скота следует применять после окончания летнего сезона.
- Для лечения чесотки у овец и верблюдов: вторую дозу следует вводить через 7 дней (для овец) и через 15 дней (для верблюдов).
- Клостридиальную вакцинацию проводят для овец до периода дегельминтизации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Мыть руки после использования.
- Избегать контакта с глазами и кожей.
- Не курить и не есть во время нанесения
- Не загрязнять водоемы, каналы и источники воды.
- Пустые контейнеры следует безопасно удалять.
- Хранить вдали от продуктов питания, напитков и детей.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30 ° C.

УПАКОВКА: (50, 100) мл.