

VERMESTIN ВЕРМЕКТИН

Раствор для инъекций
Системный препарат против паразитов
Для овец, коз, крупного рогатого скота,
буйволов, верблюдов, свиней

VARCO

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
глистогонное средство

СОСТАВ: Каждый мл содержит:

Ивермектин

10 мг

СВОЙСТВА:

- **Ивермектин**, производное авермектина, является высокоэффективным и безопасным препаратом против внутренних и внешних паразитов у животных.
- Он действует, стимулируя высвобождения химических нейромедиаторов (габа-гамма-аминомасляной кислоты), прерывая нервные импульсы, которые парализуют паразита и убивают его.
- Характеризуется быстрым распределением и продолжительным периодом выведения, обеспечивающим длительный паразитарный эффект.

ПОКАЗАНИЯ: для лечения и контроля над следующим видами паразитов:

• ЭНДОПАРАЗИТЫ:

- Желудочно-кишечные нематоды (круглые черви): *heamonchus*, *chabertia*, *ostertagia*, *nematodirus*, *trichuris*, *cooperia*, *bunostomum*, *strongyloides*, *oesophagostomum*, *trichostrongylus*, *toxocara*, *parafilaria*, *hyostrongylus*, *ascaris suum*.
- Легочные черви: *dictyocaulus*, *protostrongylus*, *metastrongylus*.
- Личинки мух: овечий носовый бот: (*oestrus ovis*), личинки.

• ЭКТОПАРАЗИТЫ:

- Миазы (личинки кожного овода у крупного рогатого скота): *Hypoderma bovis*, *H. Lineatum*
- Миазы (Тропические личинки у крупного рогатого скота): *Dermatobia hominis*.
- Миазы (вихревая муха): (Паразитическая стадия) *Chrysoma bezziana*.
- Чесоточные клещи: *Sarcoptes*, *Psoroptes*, *Chorioptes*.
- Сосущие вши: *Linognathus*, *Haematopinus*, *Solenoptes*.
- Кусаящие вши: *Damalina*.
- Клещи.
- Глазные черви: *Thelazia*.

ДОЗИРОВКА: одноразовая терапия.

- Овцы, козы, крупный рогатый скот, буйволы, верблюды: 1 мл / 50 кг массы тела путем подкожной инъекции.
- Свины: 1 мл / 35 кг массы тела путем подкожной инъекции в шею.
- Не вводить более 10 мл в одном месте инъекции. Дозу можно разделить.

СРОК ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА:

Для потребления мяса и молока: 28 дней.

Внимательно прочитайте примечания перед использованием:

- Может вызвать боль в месте инъекции.
- Не использовать для кормящих животных или в течение 28 дней до родов.
- В месте инъекции может возникать локальная реакция.
- Лечение крупного рогатого скота следует применять после окончания летнего сезона.
- Для лечения чесотки у овец и верблюдов: вторую дозу следует вводить через 7 дней (для овец) и через 15 дней (для верблюдов).
- Клостридиальную вакцинацию проводят для овец до периода дегельминтизации.

Меры предосторожности:

- Мыть руки после использования.
- Избегать контакта с глазами и кожей.
- Не курить и не есть во время нанесения препарата.
- Не загрязнять водоемы, каналы и источники воды.
- Пустые контейнеры следует безопасно удалять.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30 ° C.

УПАКОВКА: (50, 100) мл.