

فايكو ديميدين - 33 %

محلول سلفا للحقن

للضأن والماعز والأبقار والجمال والخيول والأرانب والدواجن والخنزير

التركيب : كل مل يحتوي على:

330 ملغم

سلفاديميدين صوديوم

الخواص:

- صاد بكتيري فعال ضد البكتيريا ذات صبغة جرام الايجابية والسلبية (الكولاي، المكورات العنقودية والعقدية والسالمونيلا والباستريلا والهيموفيلوس جاليناروم والليستيريا والفريو والعصيات الشعاعية وغيرها) والركتسيا وبعض انواع البروتوزوا.
- نظراً لبطء إطراح السلفا من الجهاز البولي، فان فعاليتها وتأثيرها يتركزان في معالجة اصاباته.

الاستطابات :

- للضأن والماعز والابقار والجمال والخيول والارانب والدواجن والخنزير.
- التهاب الرئة والقصبات الهوائية والنزلات المعوية والاسهالات والدوزنتاريا والأنتان الدموي(الباستريلا) ودفتيريا العجول وخنق الخيل والتهاب الرحم والعصيات الشعاعية (اللسان المتخشب) وتعفن الظلف والكوكسيديا وحمى النفاس، والتهاب المفاصل.
- الاصابات البكتيرية للاجهزة الهضمية والبوليه التناسليه.
- حمى القراد والركتسيا في الابقار (مرض القلب المائي).

الجرعات:

- يستعمل حقناً تحت الجلد أو بالعضل أو بالوريد ببطء شديد.
- جرعة الابداء: 1.5 - 2.5 مل لكل 10 كغم وزن جسم في اليوم الاول فقط.
- جرعة الاستمرار: نصف جرعة الابداء يوميا ولمده (3-5) ايام فقط.
- في الحالات الشديدة، يمكن مضاعفة جرعة الابداء.
- للدواجن والارانب (مع ماء الشرب): 3 مل/لتر ماء.

تنبيهات:

- لا يعطي في حالات اضطرابات الكبد والكلى.
- للتخفيف من تهيج الانسجه الموضعيه بعد الحقن تحت الجلد، يتم حقن الجرعه في موقعين او ثلاثه مع التداليك الكافي بعد الحقن.
- المعالجة بالسلفا لمدة طويلة قد تسبب نقص فيتامين (ك) في الجسم وبالتالي حدوث فقر الدم (الانيميا).
- تعطى كميته كافيته من ماء الشرب اثناء المعالجه، تجنباً لترسب السلفا في الكلى.
- يفضل الحقن بالوريد كلما امكن.

فترة الأمان:

- لاستهلاك اللحوم: ثمانية أيام.
- لاستهلاك الحليب: ثلاثة أيام.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 °م.

العبوات: (50، 100) مل.