

# فايكو جنت - 10 %

## محلول للحقن

التركيب: كل مل يحتوي على:

جنتاميسين (كبريتات الجنتاميسين) 100 ملغم

### الخواص:

- يتميز الصاد الحيوي جنتاميسين (مجموعة امينوجلايكوسايد) بفعالته الواسعة الطيف والقوية ضد البكتيريا ذات صبغة جرام السلبية والإيجابية: الكولاي والسالمونيلا والباستريلا والليستريا والفيريو والمكورات العنقودية والعقدية والبسودوموناس والاريسيلوثريكس وغيرها.
- يتم امتصاصه بسرعة من موقع الحقن مع بقاءه في الدم والأنسجة لمدة 12-24 ساعة، وبسبب إطراره دون أن يطرأ عليه أية تغيرات من خلال الكلى مما يجعل تركيزه عالياً في الجهاز البولي.

### الاستطابات:

- للمجترات والخيول والكلاب والقطط والخنازير والدواجن.
- إصابات الجهاز التنفسي: الالتهاب الرئوي والقصبات والشعب الهوائية.
- إصابات الجهاز الهضمي: إتهاب المعدة والبريتون والنزلات المعوية والإسهالات العادية والمدممة وزحار الفيريو.
- إصابات الجهاز البولي: التهاب الكلى والحالب والمثانة.
- إصابات الجهاز التناسلي: التهاب الرحم وعنق الرحم، والتهاب الضرع (كعلاج داعم).
- التسمم الدموي والتهاب المفاصل وإصابات الجلد والجروح.
- وقاية المواليد الجدد والحيوانات الصغيرة والمفاطم من النفوق المبكر وكذلك الصيصان الفاقسة حديثاً.

الجرعات: (يعطى حقناً بالعضل أو تحت الجلد أو بالنقع داخل الرحم).

### الحقن بالعضل:

- المجترات والخيول: 1-2 مل / 50 كغم وزن جسم.
- الكلاب والقطط والخنازير: 0.5 مل / 10 كغم وزن جسم.
- تعطى جرعتان في اليوم الأول، ثم مرة واحدة يومياً ولمدة أسبوع.
- الحقن تحت الجلد (بالرقبة):
  - الصيصان عمر يوم واحد: يخفف العلاج بالماء أو بمحلول الملح الفسيولوجي المعقمين بنسبة (1:100) ثم يحقن 0.2 مل لكل صوص.
  - صيصان الحبش (الرومي) عمر (1-3) يوم: يخفف العلاج بالماء أو بمحلول الملح الفسيولوجي المعقمين بنسبة (1:20) ثم يحقن 0.2 مل لكل صوص حبش.
- للدواجن مع ماء الشرب: 1 مل / لتر لمدة 4-5 أيام.
- الجرعة بالنقع داخل الرحم (حالات التهاب الرحم وعنقه):
  - الأبقار: 2 مل مرة يومياً مخففة مع 20-50 مل من محلول الملح الفسيولوجي المعقم.
  - الأفراس: 20-25 مل يومياً مخففة مع 200-500 مل من محلول الملح الفسيولوجي المعقم ولمدة 3-5 أيام.
  - في حالة التهاب الرحم الصددي، يجب تنظيف الرحم أولاً من الإفرازات الصدديّة قبل المعالجة.
  - لا يستعمل يوم إجراء الشبا للأفراس.

#### فترة الأمان:

- لإستهلاك اللحوم: 45 يوماً.
- لإستهلاك الحليب: ثلاثة أيام.

#### تنبيهات:

- لا يعطى مع مستحضرات التخدير أو التي تسبب ارتخاء العضلات أو مستحضرات الأمينو جلايكوسيد الأخرى أو مستحضرات البوليمكسين (الكوليستين).
- لا يعطى في حالات إضطراب الكلى.

**التخزين:** يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 °م.

**العبوات:** (50، 100) مل.