

فايكوتريم

بودرة قابلة للذوبان في الماء
للدواجن والحيوانات الأخرى

التركيب: كل غم يحتوي على:-

80 ملغم

ترايميثوبريم

400 ملغم

سلفاديازين صوديوم

الخواص:

- تركيبة مشتركة من صادين بكتيريين مما يؤدي الى تقوية الفعالية ضد البكتيريا ذات صبغة جرام الايجابية والسلبية.
- تزيد مادة الترايميثوبريم من مفعول السلفا وذلك بتنبيطه انزيم الخلية البكتيرية الضروري لعملية تحويل حامض الفوليك الى الشكل الحيوي والفاعل (حامض الفوليك) والضروري لتخليق حامض نواة الخلية (د.ن.أ) . فيما تقوم مادة السلفا (ومن خلال تثبيط استعادة الخلية لحامض البارامينوزويك الحيوي لها) بمنع تخليق حامض الفوليك في الخلية البكتيرية الامر الذي يجعلها تتوقف عن التكاثر والانقسام ، وبالتالي فان التأثير التعاضدي للمادتين على عملية الاستقلاب للبكتيريا يساعد على موتها.

الإستطبابات:

- معالجة الاصابات البكتيرية المختلفة الاساسية وتلك المصاحبة لأمراض التي تصيب الاجهزة التنفسية والهضمية والبولية : السالمونيلا والكولاي والباستريلا والنزلات المعوية والمايكوبلازما والرشح المزمن والالتهاب الرئوي وغيرها ، في الدواجن والحش والحيوانات الكبيرة .

الجرعات : (لمدة خمسة ايام).

المعالجة:

- الدواجن والحش(الرومي) : 40 غم لكل 200 لتر من ماء الشرب.
- الحيوانات الكبيرة : 1 غم لكل 15 كغم وزن جسم يومياً مع ماء الشرب.
- الوقاية: نصف الجرعة العلاجية ولمدة نفسها.
- يستعمل ماء ساخن بدرجة حرارة 50-60 °م.

فترة الامان : * لاستهلاك اللحوم والحليب: خمسة ايام.

تنبيهات :

- لا يستعمل للقطعان البيضاء.
- لا يعطى في حالات اضطرابات الكبد و الكلى و مرض الحمبورو.
- ينصح بعدم استعمال مركبات فلوموكوين اثناء المعالجة بمادة ترايميثوبريم - سلفوناميد.
- اثناء المعالجة، يجب تزويد القطعان بكميات كافية من ماء الشرب ، تجنباً لتبلور وترسب السلفا في جسم الحيوان.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 °م.

العبوات: (100، 250، 500، 1000) غم.