

فابكوتريم - بلص

بودرة قابلة للإنتشار في الماء
للدواجن والحيوانات الأخرى

التركيب: كل غم يحتوي على:-

80 ملغم	ارثرومايسين ثيوسيانيت
30 ملغم	ترايميثوبريم
150 ملغم	سلفاديازين صوديوم

الخواص:

- الارثرومايسين صاد حيوي (مجموعة الماكرولايد)، وهو مأمون الاستعمال وذو فعالية عالية ضد البكتيريا ذات صبغة جرام الايجابية والسلبية: المكورات العنقودية والعقدية، والكورايين والرشح المعدي (الكورايزا) والكولاي والباستريلا، والمايكوبلازما والمكورات الرئوية والهيموفيلوس جاليناروم والاريسبلوثريكس.
- تزيد مادة الترايميثوبريم من مفعول السلفا وذلك بتنشيطه انزيم الخلية البكتيرية الضروري لعملية تحويل حامض الفوليك الى الشكل الحيوي والفاعل (حامض الفوليك) والضروري لتخليق حامض نواة الخلية (د.ن.أ). فيما تقوم مادة السلفا (ومن خلال تنشيط استفاة الخلية لحامض البارامينونزويك الحيوي لها) بمنع تخليق حامض الفوليك في الخلية البكتيرية الامر الذي يجعلها تتوقف عن التكاثر والانقسام، وبالتالي فان التأثير التعاضدي للمادتين على عملية الاستقلاب للبكتيريا يساعد على موتها.

الإستطبابات:

- **الدواجن:**
للقاية ومعالجة الأمراض المختلفة: الرشح المزمن والمايكوبلازما والرشح المعدي (الكورايزا)، والتهاب التجاويف الأنفية والتهاب الأكياس الهوائية، والسالمونيلا والباستريلا والكولاي والتهاب الغشاء الزلالي للمفاصل، واصابات المكورات العنقودية والعقدية والنزلات المعوية والإسهالات والتهاب الكبد الفيروني.
- حالات الإجهاد الناتجة عن اللقاحات وقص المناقير والنقل وتغيير بيوت الدواجن والعلف واختلاف الأحوال الجوية.
- **الحيوانات الأخرى:** حالات الإلتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية والنزلات المعوية والإسهالات وغيرها.

الجرعات: (يتم تحريك المزيج جيداً قبل الإستعمال).

- **المعالجة:** (لمدة خمسة أيام).
- **الدواجن:** 100 غم لكل 200 لتر من ماء الشرب.
- **الحيوانات الأخرى:** 2 غم / 15 كغم وزن جسم يومياً مع ماء الشرب.
- **الوقاية:** نصف الجرعة العلاجية ولمدة نفسها.
- ويستعمل ماء ساخن بدرجة حرارة 50-60 م°.

فترة الأمان: * لاستهلاك اللحوم والحليب: أسبوع.

تنبيهات:

- لا يستعمل للقطعان البيضاء.
- لا يعطى في حالات اضطرابات الكبد و الكلى و مرض الجمبورو.
- ينصح بعدم استعمال مركبات فلوموكوين اثناء المعالجة بمادة ترايميثوبريم - سلفوناميد.
- اثناء المعالجة، يجب توفير كميات كافية من ماء الشرب ، تجنباً لتبلور وترسب السلفا في جسم الحيوان.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 م°.

العبوات: (100، 250، 500، 1000) غم.