

فيرمكتين

محلول للحقن

علاج جهازى ضد الطفيليات

للضأن والماعز والأبقار والجواميس والجمال والخنازير

التركيب: كل مل يحتوي على:

10 ملغم

ايفرمكتين

الخواص:

- الإيفرمكتين (مشتقات الأيفرمكتين) المأمون الاستعمال وواسع الفعالية ضد إصابات الطفيليات الداخلية والخارجية التي تهاجم الثروة الحيوانية.
- تعمل مادة الأيفرمكتين على إثارة الجهاز العصبي للطفيليات لتفرز مادة (جاما أمينو بيوتريك) والتي تعمل بدورها كناقل عصبي كيميائي للإشارات بين الخلايا العصبية نفسها أو بين الخلايا العصبية والعضلية حيث تنتقطع تلك الإشارات مما يؤدي إلى شلل الطفيليات وموتها.
- يتميز بسرعة انتشاره في الدورة الدموية وطول فترة إطراره من الجسم مما يؤدي إلى تأثير دائم في مكافحة الطفيليات.

الاستطبابات: لعلاج ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية:

- الطفيليات الداخلية:
 - الديدان المعدية والمعوية:
 - هيومنكس، شابيرتيا، أوسترتاجيا، نيماتودايرس، ترايكيوريس، بونوستوم، كوبيريا، سترونجيلويدس، أوسيفاجوستوم، ترايكوسترونجائلس.
 - الديدان الرئوية: ديكتيوكولاس، بروتوسترونجائلس، ميتاسترونجائلس.
 - نغف الأنف في الضأن: يرقات أوستريس أوفيس.
 - الطفيليات الخارجية:
 - التدويد (نغف الجلد في الأبقار): هيبوديرمايوفيس، هيبوديرمالينياتوم.
 - التدويد (نغف الجلد في أبقار المناطق الإستوائية): درماتوبياهومينيس.
 - التدويد (الذبابة الحلزونية): كريزومايزانا (مرحلة التطفل).
 - الجرب: ساركوبتس، بسوروبتس، كوريبوتس.
 - القمل الماص: لينوجناتس، هيماتوبائيس، سولينوبتس.
 - القمل القارص: دامالينا.
 - القراد.
 - دودة العين: ثيلازيا.

الجرعات: يعطى حقناً تحت الجلد وبجرعة واحدة.

- الضأن والماعز والأبقار والجواميس والجمال: 1 مل / 50 كغم وزن جسم.
- الخنازير: 1 مل / 35 كغم وزن جسم تعطى حقناً تحت الجلد بمنطقة الرقبة.

فترة الأمان:

- لاستهلاك اللحوم والحليب: 28 يوماً.

تنبيهات:

- يجب عدم حقن أكثر من (10) مل في موقع واحد.
- يمكن تقسيم الجرعة على مواقع حقن مختلفة.
- لا يعطى للحيوانات الحلابة أو خلال (28) يوماً قبل الولادة.
- احتمال حدوث تهيج تفاعلي موضعي عابر في موقع الحقن.
- يجب معالجة نغف الجلد في الأبقار بعد انتهاء موسم الذبابة المسببة للاصابة.
- لمعالجة الجرب في الضأن والجمال: تعطى جرعة ثانية بعد أسبوع للأغنام، وبعد (15) يوماً للجمال.
- ينصح بإعطاء لقاح كلوستريديا للأغنام قبل مكافحة الديدان.

تحذيرات:

- يجب غسل الأيدي بعد استعمال العلاج.
 - تجنب ملامسة العلاج للعيون والفم والجلد.
 - تجنب الأكل والشرب والتدخين أثناء استعمال العلاج.
 - يجب عدم تلويث البرك وقنوات ومصادر المياه.
 - يجب التخلص من العبوات الفارغة بطريقة مأمومة وسليمة.
- التخزين:** يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 °م.

العبوات: (50، 100) مل.