

فيتامين أد3هـ

محلول للحقن

التركيب: كل مل يحتوي على:

100000	وحدة دولية	فيتامين أ
25000	وحدة دولية	فيتامين د3
100	وحدة دولية	فيتامين هـ

الخواص:

- فيتامين أ (راتينول):
 - يساعد على تشكيل وتجدد الخلايا الظهارية للجلد والأغشية المخاطية.
 - يزيد مقاومة الجسم ضد الأمراض الخمجية.
 - ضروري للخصوبة والنمو.
- فيتامين د (كولكالسيفورول): ضروري لإمتصاص واستقلاب (الأبيض) لمادتي الكالسيوم والفسفور.
- فيتامين هـ (توكوفيرول):
 - ضروري للوظيفة الطبيعية لعضلة القلب.
 - منظم لعملية إستقلاب (الأبيض) البروتين والنشويات والأملاح المعدنية.
 - مضاد للتأكسد بعملية الإستقلاب (الأبيض) في الخلايا.
 - يعمل على تقوية المناعة مما يؤدي إلى زيادة مقاومة الجسم ضد الأمراض.

الاستطبايات:

- للأبقار والجواميس والضأن والماعز والجمال والخيول والخنازير.
- مصدر إضافي للفيتامينات (أ، د، هـ).
- للوقاية ومعالجة حالات نقص الفيتامينات وخصوصاً في المواليد: الكساح وإعتلال وضعف العضلات ولين العظام وضعف النمو.
- زيادة الحيوية وتحسين الاستجابة المناعية وتحفيز الجسم لمكافحة الأمراض.
- للحصول على أفضل نتائج للتربية وعلى الأداء الجيد.
- مساعدة الحيوانات الحوامل.
- تحسين معدلات التحويل العلفي والنمو والخصوبة ولزيادة الوزن وإنتاج الحليب.
- حالات الإجهاد الناتج عن الأمراض المختلفة وإصابات الديدان والنقل وتغيير العلف واختلاف الأحوال الجوية، وفترة النقاهاة حيث تزداد المتطلبات لمثل هذه الفيتامينات.
- حالات العشى الليلي وتقرن القرنية.

الجرعات:

- الأبقار والجواميس والجمال والخيول: 8-10 مل للحيوان الواحد.
- العجول والضأن والماعز والأمهر والخنزير: 2-5 مل للحيوان الواحد.
- الحملان والسخول والخنزير الصغيرة: 1-2 مل للحيوان الواحد.
- للحيوانات في مرحلة التربية: يمكن تكرار الجرعة كل 2-3 أشهر.
- طريقة الحقن:
 - للحيوانات الكبيرة: بالحقن عميقاً في عضلات الرقبة.
 - للضأن والماعز: بالحقن تحت الجلد بمنطقة الكتف.
- يمكن تكرار الجرعة كل ثلاثة أشهر عند الضرورة.
- للحيوانات الحوامل: تعطى جرعة منفردة وبشكل دائم قبل الولادة كل 3-4 أسابيع.
- عند الضرورة يتم إجراء التدليك في موقع الحقن للمساعدة على الامتصاص.

تنبيهات:

- يجب عدم تجاوز الجرعات المقررة تجنباً لحدوث فرط الفيتامينات والتي تؤدي إلى اضطرابات صحية عديدة.
- احتمال حدوث تفاعل موضعي في موقع الحقن.
- احتمال حدوث رد فعل تحسسي، وفي مثل هذه الحالة يجب إعطاء الأبينفرين أو مضادات الهستامين الأخرى.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 °م.

العبوات: (50، 100) مل.