

فيتامين ك (12.5%)

بودرة قابلة للذوبان في الماء

التركيب: كل غم يحتوي على:

فيتامين ك3 (ميناديون صوديوم بايسلفايت) 125 ملغم

الاستطبابات:

■ الدواجن:

- الحالات المصحوبة بالانزفة والنتاجة عن اصابات الكوكسيديا والكولاي والجمبورو والديدان المعوية وحالات التسمم بمركبات السلفا، وقص المناقير.
- كما يستعمل في حالات الاجهاد المتسببة عن الامراض التنفسية البكتيرية والفيروسية، والاصابات المعدية المعوية البكتيرية.
- حالات الاجهاد الناتجة عن اللقاحات وقص المناقير والنقل وتغيير بيوت الدواجن واختلاف الاحوال الجوية.
- دجاج البيض: لمنع تكوّن البقع الدموية في البيض.
- دجاج الأمات: لتقليل معدلات نفوق الاجنة في البيض والصيصان الفاقسة حديثاً.

■ الحيوانات الاخرى:

- حالات الرعاف (نزف الانف) في الفصيلة الخيلية.
- حالات البرقان في المواليد الحديثة، والانزفة وفقر الدم، والتسمم بمركبات المعادن الثقيلة، والاضطرابات الكبدية والمعوية.
- منع ومعالجة حالات النزف في العمليات الجراحية والولادة.

■ الاسماك :

- خفض حالات نفوق الاجنة في البيض وبالتالي زيادة معدلات فقسه.

الجرعات:

- مدة المعالجة من 3-5 ايام.
- في الحالات الشديدة تضاعف الجرعة.
- الدواجن: 10 غم / 200 لتر ماء.
- الحيوانات الاخرى: 1 غم/30 كغم وزن.
- الاسماك: 50 غم / طن علف.

ملاحظات:

- لا ينصح باستعمال فيتامين ك3 في الحالات التالية، وذلك نظراً لقصور فعاليته:
 - حالات نقص بروثرومبين الدم في الحيوانات الصغيرة.
 - حالات التسمم بالمواد المضادة لتخثر الدم (مشتقات الكومارين) مثل:
 - وارفارين (مبيد القوارض).
 - دايكومارين الناتج عن تعفن نبات (الحنديق الحقلي) والتي تتناولها الابقار احياناً في المراعي ويتسبب عنه حالات نقص فيتامين ك لديها.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة اقل من 25 °م.

العبوات: (100، 250، 500، 1000) غم.