

فيتامين ك (25%)

بودرة قابلة للذوبان في الماء

التركيب: كل غم يحتوي على:

250 ملغم

فيتامين ك3 (ميناديون صوديوم بيسلفايت)

الاستطبابات:

الدواجن:

- الحالات المصحوبة بالانزفة والناتجة عن اصابات الكوكسيديا والكولاي والجمبورو والديدان المعوية وحالات التسمم بمركيبات السلفا، وقص المناقير.
- كما يستعمل في حالات الاجهاد المتنسبية عن الامراض التنفسية البكتيرية والفيروسية، والاصابات المعدية المعوية البكتيرية.
- حالات الاجهاد الناتجة عن اللقاحات وقص المناقير والنقل وتغيير بيوت الدواجن واختلاف الاحوال الجوية.
- دجاج البيض: لمنع تكون البقع الدموية في البيض.
- دجاج الامات: لتقليل معدلات نفوق الاجنة في البيض والصيصان الفاسدة حديثاً.

الحيوانات الأخرى:

- حالات الرعاف (نزف الانف) في الفصيلة الخيلية.
- حالات اليرقان في المواليد الحديثة، والانزفة وفتر الدم، والتسمم بمركيبات المعادن الثقيلة، والاضطرابات الكبدية والمعوية.
- منع ومعالجة حالات النزف في العمليات الجراحية ولادة.

الاسماك:

- خفض حالات نفوق الاجنة في البيض وبالتالي زيادة معدلات فقسها.

الجرعات:

مدة المعالجة من 3-5 ايام.

في الحالات الشديدة تضاعف الجرعة.

الدواجن: 5 غم / 200 لتر ماء.

الحيوانات الأخرى: 0.5 غم / 30 كغم وزن.

الاسماك: 25 غم / طن علف.

ملاحظات:

- لا ينصح باستعمال فيتامين ك3 في الحالات التالية، وذلك نظراً لقصور فعاليته:
 - حالات نقص بروثرومبين الدم في الحيوانات الصغيرة.
 - حالات التسمم بالمواد المضادة لتخثر الدم (مشتقات الكومارين) مثل: وارفارين (مييد القوارض).
- دايكومارين الناتج عن تعفن نبات (الحنďقون الحقلوي) والتي تتناوله الابقار احياناً في المراعي ويسبب عنه حالات نقص فيتامين ك لديهها.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم ودرجة حرارة أقل من 25 °م.

العبوات: (100، 250، 500، 1000) غم.