

# دوكلين

بودرة قابلة للذوبان في الماء

التركيب: كل غم يحتوي على:-

دوكسي سايكلين هيدروكلورايد 300 ملغم  
كبريتات الكوليسيتين 800.000 وحدة دولية

## الخواص:

- تركيبة مشتركة من صادين حيويين والتي تؤدي إلى فعالية قوية وتعزيز كفاءة العلاج ضد الإصابات المعوية البكتيرية.
- الدوكسي سايكلين صاد حيوي ذو فعالية واسعة تدوم طويلاً ويتميز بسرعة امتصاصه وبطء إطراره.
- الكوليسيتين صاد حيوي فعال ضد البكتيريا ذات صبغة جرام السلبية والتي تسبب الإصابات المعوية.
- كما يعمل الكوليسيتين على إحداث تغيرات في مسامية ونفاذية الخلية البكتيرية مما يؤدي إلى موتها.

## الإستطبابات:

- للدواجن والطيور البرية والحمام والعجول والحملان والسخول.
- للمعالجة والوقاية من الأمراض المختلفة التي تصيب الجهازين التنفسي والهضمي : الرش المزمن والرشح المعدي (الكورايذا) والكولاي والمايكوبلازما والتهاب الاكياس الهوائية والسالمونيلا وكوليرا الطيور والتهاب الأمعاء النخري (كلوستريديا) والتهاب السرة وكيس الصفار والنزلات المعوية والإسهالات.
- المعالجة الوقائية للنفوق المبكر في المواليد والحيوانات الصغيرة.
- حالات الإجهاد الناتجة عن اللقاحات وقص المناقير والنقل وتغيير بيوت الدواجن والعلف واختلاف الأحوال الجوية.

## الجرعات: (لمدة 3-5 أيام).

### المعالجة:

- الدواجن: 100 غم لكل 200 لتر من ماء الشرب.
- الطيور البرية والحمام: 0.5 غم / لتر من ماء الشرب.
- العجول والحملان والسخول: 1-2 غم / 10 كغم وزن جسم يومياً مع ماء الشرب.
- الوقاية: نصف الجرعة العلاجية ولمدة نفسها.

## فترة الأمان: لاستهلاك اللحم:

- للعجول والحملان والسخول : 14 يوم
- للدواجن : 7 أيام.

## تنبيهات:

- لا يستعمل لدجاج بيض المائدة.
- اثناء المعالجة ، يجب عدم استعمال البيض للاستهلاك البشري .
- يجب عدم إضافة الأملاح المعدنية إلى ماء الشرب الذي يحتوي على العلاج.

**التخزين:** يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30°م.

**العبوات:** (100، 250، 500، 1000) غم.