

# دوكسيفاب

بودرة قابلة للذوبان في الماء

التركيب: كل غم يحتوي على:-

دوكسي سايكلين هيدروكلورايد 200 ملغم

## الخواص:

- الدوكسي سايكلين صاد حيوي واسع الفعالية (مجموعة التتراسايكلين) إلا أنه يتميز عنها بسرعة امتصاصه من الامعاء ونفاذه الواسع للأنسجة ويطء اطراحه.
- الدوكسي سايكلين له فعالية تدوم طويلاً ، وهو علاج مأمون الاستعمال حتى بوجود حالات اضطرابات الكلى .
- يستخدم الدوكسي سايكلين في حالات الأمراض المختلفة التي تصيب الأجهزة التنفسية والهضمية والبولية التناسلية والمتسببة عن الاصابات بالمايكوبلازما والبكتيريا ذات صبغة جرام الايجابية والسلبية (المكورات العنقودية والعقدية ، والكولاي والكلاميديا والكلوستريديا والريكتسيا والكاميبلوباكتري والباستيريلا واللبتوسبيرا والسبيروكيئا والبسودوموناس والفريو و الليستيريا والشيجيلا والكلبيسيلا).

## الإستطبابات:

- يعطى للدواجن والعجول والحملان والسخول والكلاب والقطط وطيور الاقفاص والحمام والخنزير .
- للمعالجة والوقاية من الامراض المختلفة: الرشح المزمع والمايكوبلازما والتهاب التجاويف الانفية والرشح المعدي (كورايزا) والتهاب الاغشية الزلالية للمفاصل والحمى الببغائية في الطيور والكولاي وكوليرا الطيور والتهاب الامعاء النخري (الكلوستريديا) والنزلات المعوية والاسهالات البكتيرية المختلفة.

الجرعات: ( لمدة 4-5 أيام ) .

## المعالجة:

- الدواجن: 100 غم / 200 لتر من ماء الشرب.
- الحمام و طيور الأقفاص: 0.65 غم / لتر من ماء الشرب.
- الحيوانات الأخرى والخنزير: 0.5 غم / 10 كغم وزن جسم يومياً مع ماء الشرب.
- الوقاية: نصف الجرعة العلاجية ولمدة نفسها.

فترة الأمان: \* لاستهلاك اللحوم: للعجول والسخول والحملان : 14 يوم.

للخنزير : 8 أيام

للدواجن : 5 أيام.

\* لاستهلاك البيض: 4 أيام.

## تنبيهات:

- أثناء المعالجة ، يجب عدم استعمال البيض للاستهلاك البشري.
- يجب عدم اضافة الاملاح المعدنية الى ماء الشرب الذي يحتوي على العلاج .

فانكو

الصادات البكتيرية

**التخزين:** يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل 30°م.

**العبوات:** (100، 250، 500، 1000) غم.

فاركو

الصادات البكتيرية