

دوكسيفاب - مقوى

بودرة قابلة للذوبان في الماء

التركيب: كل غم يحتوي على:-

دوكسي سايكلين هيدروكلورايد 500 ملغم

الخواص:

- الدوكسي سايكلين صاد حيوي واسع الفعالية (مجموعة التتراسايكلين) إلا أنه يتميز عنها بسرعة امتصاصه من الامعاء ونفاذه الواسع للأنسجة وبطء اطرأحه.
- الدوكسي سايكلين له فعالية تدوم طويلاً ، وهو علاج مأمون الاستعمال حتى بوجود حالات اضطرابات الكلى.
- يستخدم الدوكسي سايكلين في حالات الأمراض المختلفة التي تصيب الأجهزة التنفسية والهضمية والبولية التناسلية والمتسببة عن الاصابات بالميكوبلازما والبكتيريا ذات صبغة جرام الايجابية والسلبية (المكورات العنقودية والعقدية ، والكولاي والكلاميديا والكلوستريديا والريكتسيا والكامبيلوباكتر والباستيريلا واللبتوسبيرا والسبيروكيتا والبسودوموناس والفريو و الليستيريا والشيجيلا والكلبسيلا).

الإستطبابات:

- يعطى للدواجن والعجول والحملان والسخول والكلاب والقطط وطيور الاقفاص والحمام والخنازير .
- للمعالجة والوقاية من الامراض المختلفة: الرشح المزمع والميكوبلازما والتهاب التجاويف الانفية والرشح المعدي (كورايزا) والتهاب الاغشية الزلالية للمفاصل والحمى الببغائية في الطيور والكولاي وكوليرا الطيور والتهاب الامعاء النخري (الكلوستريديا) والنزلات المعوية والاسهالات البكتيرية المختلفة.

الجرعات: (لمدة 4-5 أيام) .

المعالجة:

- الدواجن: 40 غم / 200 لتر من ماء الشرب.
- الحمام و طيور الأقفاص: 0.26 غم / لتر من ماء الشرب.
- الحيوانات الأخرى والخنازير: 0.2 غم / 10 كغم وزن جسم يومياً مع ماء الشرب.
- الوقاية: نصف الجرعة العلاجية والمدة نفسها.

فترة الأمان: * لاستهلاك اللحوم: للعجول والسخول والحملان : 14 يوم.

للدواجن : 7 أيام.

تنبيهات:

- أثناء المعالجة ، يجب عدم استعمال البيض للاستهلاك البشري.
- لا يستعمل لدجاج بيض المائدة.
- يجب عدم اضافة الاملاح المعدنية الى ماء الشرب الذي يحتوي على العلاج .

فانكو

الصادات البكتيرية

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات: (100، 250، 500، 1000) غم.