

أوكسي دوكسي

بودرة قابلة للذوبان في الماء

التركيب: كل غم يحتوي على:-

| | |
|----------|--------------------------------|
| 100 ملغم | دوكسي سايكلين هيدروكلورايد |
| 200 ملغم | اوكسي تتراسايكلين هيدروكلورايد |

الخواص:

- التأثير المشترك القوي للصادين الحيويين والتميزين بالفعالية الواسعة الطيف ضد الأمراض المتسببة عن البكتيريا ذات صبغة جرام الإيجابية والسلبية وبعض الفيروسات الكبيرة.
- الامتصاص السريع لمادة دوكسي سايكلين من الامعاء مع ببطء إفرازها من الجسم يزيد من فعاليتها.

الإستطبابات:

- للوقاية ومعالجة الأمراض المختلفة التي تصيب الأجهزة التنفسية والهضمية والبولية التناسلية: الرشح المزمن والمايكوبلازما والرشح المعدي (كورايزا) والكولاي والنزلات المعوية والتهاب السرة وكيس الصفار ، والسالمونيلا والباستريلا والتهاب الأكياس الهوائية والتهاب التجاويف الأنفية والتهاب الأغشية الزلالية للمفاصل وإصابات الكورايين و الكلبسيلا والمكورات العنقودية والعقدية والهكساميتيازيس وزهري الطيور (السيبروكيتا) والليستيريا واللبتوسيرا والفريو والإسهالات والتهاب الأمعاء النخري (الكلوستريديا).
- حالات الإجهاد الناتجة عن اللقاحات وقص المناقير والنقل وتغيير بيوت الدواجن والعلف واختلاف الأحوال الجوية.

الجرعات: لمدة خمسة أيام.

المعالجة:

- الدواجن: 100 غم لكل 200 لتر من ماء الشرب.
- العجول والحملان والسخول (قبل بدء مرحلة الاجترار) : 0.5 غم / 10 كغم وزن جسم يومياً مع ماء الشرب .
- الوقاية: نصف الجرعة العلاجية ولمدة نفسها.

فترة الأمان: * لاستهلاك اللحوم والبيض: اسبوع.

تنبيهات:

- أثناء المعالجة ، يجب عدم استعمال البيض للاستهلاك البشري.
- يجب عدم اضافة الاملاح المعدنية الى ماء الشرب الذي يحتوي على العلاج .

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات: (100، 250، 500، 1000) غم.