

أوكسيدون مقوى - 20 %

مديد التأثير
للحيوانات المختلفة

التركيب: كل مل يحتوي على:

200 ملغم

أوكسي تتراسايكلين

الخواص:

الصاد البكتيري واسع الطيف وجهازي الفاعلية ضد البكتيريا التالية:

- البكتيريا ذات صبغة جرام الإيجابية: المكورات العنقودية والعقدية والكوارين والكلوستريديا والأريسبلوثريكس.
- البكتيريا ذات صبغة جرام السلبية: (الكولاي والباستريلا والعصيات الشعاعية والموراكسلا).
- المايكوبلازما والأوليات (البروتوزوا) والهيموفيلوس والسبيروكيئا والكلاميديا واللبتوسبيرا والركتسيا والليستيريا وبعض الفيروسات الكبيرة.
- امتصاصه وانتشاره في الجسم سريع.

الاستطبابات:

- للضأن والماعز والأبقار والجواميس والجمال والخنزير.
- معالجة الحالات التالية:
 - حمى الشحن (الباستريلا)، اللسان المتخشب (اكتينوباسيلوس)، التهاب القرنية والملتحمة الخمجي (موراكسلا)، تعفن الظلف، دفتريا العجول، دوزنتاريا الخنازير (سبيروكيئا)، رشخ الخنازير، الأجلالكيئا المعدية في الخنازير.
 - الأوليات (الأنا بلازما، التاليليريا)، اللبتوسبيرا في العجول، الرشخ القلبي في الأبقار (الركتسيا).
 - إجهاض الكلاميديا في الضأن والماعز.
 - الكلوستريديا: الأنتروتوكسيميا (زحار "دوزنتاريا" الحملان)، الجمرة العرضية، الإرتشاح الخبيث في الضأن.
 - النزلات المعوية والإسهالات.
 - الأنتان الدموي، التقيح الدموي، التهاب العشاء البريتوني، التهاب السرة والمفاصل، التهاب الجلد والجروح والخزاج.
 - المعالجة الداعمة لالتهاب الضرع.
 - أخماج الجهاز التنفسي: التهاب الرئة والشعب الهوائية والرشخ الخ....
 - أخماج الجهاز البولي: التهاب الكلى والمثانة الخ...
 - أخماج الجهاز التناسلي: التهاب الرحم وعنقه، تسمم الحمل الخ....
 - الوقاية من التلوث والإلتهابات بعد الولادة والعمليات الجراحية.
 - الأخماج البكتيرية المصاحبة للأمراض الفيروسية.

الجرعات:

- يعطى حقناً عميقاً بالعضل.
- في الحالات الشديدة، يمكن تكرار الجرعة بعد (3-5) ايام.
- لا يحقن اكثر من (20) مل في موقع الحقن الواحد (للابقار والجواميس والجمال)، ولا اكثر من (5) مل (للضأن والماعز والخنازير).
- الأبقار والجواميس والجمال والضأن والماعز والخنازير: 1مل/10 كغم وزن جسم بجرعة منفردة.
(20 ملغم فعالية/كغم وزن جسم)

فترة الأمان:

- لاستهلاك اللحوم: 28 يوم.
- لاستهلاك الحليب: 4 أيام.

تنبيهات:

- لا يعطى للخيل والكلاب والقطط.
- يفضل تقسيم الجرعات على عدة مواقع حقن.
- إحتمال حدوث تورم موضعي عابر لبضعة أيام في موقع الحقن.
- احتمال حدوث تفاعل تحسسي، وفي مثل هذه الحالة تعطى مضادات الهستامين (الابنفرين) فوراً، وتتم المعالجة حسب الاعراض ، عند الضرورة.
- لا يعطى مع البنسلين ومستحضرات الكالسيوم والحديد تجنباً لحدوث تداخلات دوائية.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 °م.

العبوات: (50، 100) مل.