

أوكسي تتراسايكلين - 50 %

بودرة قابلة للذوبان في الماء

التركيب: كل غم يحتوي على:-

أوكسي تتراسايكلين هيدروكلورايد 500 ملغم

الخواص:

- صاد حيوي واسع الطيف وجهازي الفاعلية ضد البكتيريا ذات صبغة جرام الإيجابية والسلبية وبعض الفيروسات الكبيرة.

الإستطبابات:

- للوقاية ومعالجة الأمراض المختلفة التي تصيب الأجهزة التنفسية والهضمية والبولية التناسلية: الرشح المزمن والمايكوبلازما والرشح المعدي (كورايزا) والكولاي والنزلات المعوية والتهاب السرة وكيس الصفار والسالمونيلا والباستريلا والتهاب الأكياس الهوائية والتهاب التجاوبف الأنفية والتهاب الأغشية الزلالية للمفاصل وإصابات المكورات العنقودية والعقدية والكورين والكلبسيلا والهكساميتيازيس وزهري الطيور (السبيروكيتا) والليستيريا واللبتوسيرا والفريو والإسهالات والتهاب الأمعاء النخري (الكلوستريديا).
- حالات الإجهاد الناتجة عن اللقاحات وقص المناقير والنقل وتغيير بيوت الدواجن والعلف واختلاف الأحوال الجوية.

الجرعات: (لمدة 3-5 أيام) .

■ المعالجة:

● الدواجن:

50 غم لكل 200 لتر من ماء الشرب.

● العجول والحملان والسخول: (قبل بدء مرحلة الإجتزار).

0.5 غم لكل 20 كغم وزن جسم يومياً مع ماء الشرب.

● لكل طن علف: 0.5 كغم.

■ الوقاية: نصف الجرعة العلاجية ولمدة نفسها.

فترة الأمان: (بعد اخر جرعة)

* لاستهلاك اللحوم: 14 يوم .

* لاستهلاك البيض: 4 أيام .

تنبيهات:

- أثناء المعالجة ، يجب عدم استعمال البيض لاستهلاك البشري.
- يجب عدم اضافة الاملاح المعدنية الى ماء الشرب الذي يحتوي الى العلاج .

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات: (100، 250، 500، 1000) غم.