

المجموعة :
Avermectin

ايمافاب- ٥%

مبيد حشري

حبيبات ذائبة في الماء



مبيد حشري غير جهازى يعمل على اختراق انسجة النبات ويعمل على شل حركة حشرات حرشفية الاجنحة ويوقفها عن التغذية بعد ساعات ويمكن ملاحظة موتها بعد ٢ - ٤ ايام .

التركيب: كل كغم يحتوي على :

٥% و/و (مادة فعالة)

ايمامكتين بنزويث

الخواص :

ايمافاب- ٥%: مبيد حشري اختياري وله تاثير بالملامسة ،تأثيره بالتغذية اكثر فعالية .

ايمافاب- ٥%: مبيد حشري غير جهازى يقضى على الديدان والعتث بكافة انواعها التي تصيب العديد من المحاصيل الزراعية وخصوصا تلك التي اكتسبت مناعة ضد المبيدات التقليدية الحشرية الاخرى .

ايمافاب- ٥%: عند رشه على المزروعات فانه ينفذ داخل انسجة النبات مما يؤدي الى اثر متبقى فعال وقاتل طويل الامد ضد الحشرات .

ايمافاب- ٥%: ليس له تأثيرات ضارة على النباتات .

الاستعمالات :

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال غم / ٢٠ لتر ماء	توصيات	فترة الأمان (أيام)
الملفوف، البروكلي، الزهرة	ديدان الشمندر القارضة عثة الظهر الماسي، دودة الملفوف، نفاقاات اوراق الملفوف، نفاقاات الاوراق.	٢,٠ - ٤,٠ ٢,٢٤ - ٣,٤	تتم المعاملة عند الظهور الاولى لليرقات، ويتم تكرار الرش للمحافظة على افضل النتائج.	١٤ ٧
الخس، الكرفس، السبانخ.	الديدان القارضة	٢,٠ - ٣,٤		٧
الباذنجان، الفلفل، البندورة.	الديدان القارضة ، نفاقاات اوراق الملفوف ، ديدان براعم التبغ ، دودة ثمار البندورة . نفاقاات الفصه ، نفاقاات الاوراق	٢,٠ - ٣,٤ ٢,٢٤ - ٣,٤		٧
التفاح، الاجاص، السفرجل.	ديدان البراعم، نفاقاات الاوراق ، نفاقاات الاوراق ، اللحم.	٢,٠ - ٣,٤		١٤

تحذير : تجنب استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة اعلاه مع الالتزام بفترات الأمان قبل القطف.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش : عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على اخر المعاملة .

قابلية الخلط : قابل للخلط مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية والاسمدة الورقية ولكن ينصح بعمل تجربة خلط مبدئية